

**Item 74: Tobramicina 3mg/g
associada a Dexametasona
1mg/g pomada oftálmica estéril
bisnaga**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

Pague com Cartão

Central de

Vendedores


Visite o Site

Bemol

Ajuda

Online

Faça o Bemol



bemol farma

Vida Saudável

login
ou
registre-se

000822
R\$ 0,00

Ola, e que você procura?

BUSCAR

Medicamentos

Beleza

Dermocosméticos

Mamãe e Bebê

Alimentos e Nutrição

Óculos e Lentes

Saúde

Marca Exclusiva

Plantas

Serviços Farma

[Página Inicial](#) / [Medicamentos](#) / [Olhos](#) / [Tratamento de Distrofia do Globo Ocular](#) / [Similar](#) /

Tobracort 3mg/g + 1mg/g Pomada Oftálmica 3,5g



Agora compras acima de R\$100 têm opção de frete grátis para Manaus

Voltar

Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade.



Tobracort 3mg/G + 1mg/G Pomada Oftálmica 3,5g

UNIAO QUIMICA | Código: 4013658

R\$ 38,20 $\div 3,5g = 10,9142$

RETENÇÃO DE RECEITA. VENDAS SOMENTE EM LOJA FÍSICA.

RETENÇÃO DE RECEITA. VENDAS SOMENTE EM LOJA FÍSICA.

Disponibilidade nas Farmas

Calcular frete:

Digite seu CEP

OK

Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade.

Tobracort 3mg/g + 1mg/g Pomada Oftálmica Bisnaga com 3,5g Tobramicina + Dexametasona União Química Similar **823**

Para que este medicamento é indicado?

TOBRACULAR® solução oftálmica é um antibiótico tópico indicado para o tratamento de infecções externas dos olhos e seus anexos, causadas por bactérias sensíveis à tobramicina.

Contraindicações

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento

É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO.

Características

Fabricante	União Química
Bula	Ver Bula
Registro MS	167730540
Princípio Ativo	Tobramicina+Dexametasona
Forma Farmacêutica	Pomada Oftálmica
Tipo de Medicamento	Similar
Classe Terapêutica	Associações Oftalmológicas Cor

Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade.

Apresentação Completa	3mg/g + 1mg/g Pomada Oftálmica
Retem Receita	Sim
Concentração	3mg/g + 1mg/g
Quantidade	3,5

Estoque nas Farmas

Farmácia Amazonas Shopping Farmácia Grande Circular Farmácia Matriz

Bemol Farma DB Ponta Negra Farmácia Ephigênio Salles

MEDICAMENTOS BELEZA

Alergias e Gripe
 Sistema Nervoso
 Digestão e
 Gastrointestinais
 Vitaminas e Sais
 Minerais
 Sistema Imunológico
 Sistema Circulatório
 e Cardiovascular
 Veja mais

Perfumaria
 Cabelo
 Maquiagem
 Corpo
 Depilação
 Mãos e Pés

Veja mais

DERMOCOSMÉTICOSMAMÃE E BEBÊ

Corpo
 Rosto
 Cabelo

Fralda Infantil
 Acessórios Infantis
 Alimentos Infantis
 Cuidados com a mãe
 Corpo e Banho
 Infantil

Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade.

ACEITAR

000825



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.565.289/0036-77 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/10/2016
NOME EMPRESARIAL BEMOL S/A				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BEMOL FARMA TORQUATO				PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada				
LOGRADOURO AV TORQUATO TAPAÇOS		NÚMERO 485	COMPLEMENTO A	
CEP 69.041-025	BAIRRO/DISTRITO TARUMA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEBEMOL@BEMOL.COM.BR		TELEFONE (92) 3133-3700		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/06/2023** às **14:54:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido*

R\$ 01826



Olá, o que você está buscando hoje? :)



< Contra

Tobracort 3 + 1mg/g pomada oftálmica bisnaga com 35g

União Química Cód: 2680018

★★★★★ 0 avaliações

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online. Compre este medicamento em uma de nossas lojas*.

Tobracort 3 + 1mg/g pomada oftálmica bisnaga com 35g é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

R\$ 40,73

40,73 - 15% = 34,42

R\$ 34,42

15% OFF

1x de R\$ 34,42 s/ juros no cartão

[Nossas Lojas](#)

*Consulte a disponibilidade do produto na loja.

Indicação

Inflamações e infecções oculares (Pálpebras, córnea e globo ocular)

Traumas corneanos causados por queimaduras.

Inflamações oculares causadas pelos microorganismos: *Staphylococcus Aureus*, *Escherichia Coli*, *Klebsiella*, *Neisseria* e *Pseudomonas*

indicado nas condições inflamatórias oculares sensíveis a esteróide e onde existe infecção ocular bacteriana superficial ou o risco de infecção ocular bacteriana.

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido*



O uso dessas associações é sempre contra-indicado após remoção de corpo estranho da córnea.
 Se o uso ultrapassar 10 dias deve-se avaliar a pressão intraocular.
 Ceratite epitelial por herpes simples (ceratite dendrítica), varicela, varicela e muitas outras doenças virais da córnea e conjuntiva. Infecções oculares por micobactérias.
 Doenças micóticas oculares
 Hipersensibilidade aos componentes da medicação.
 Gravidez e lactação.

Como usar

- Agitar bem antes de usar
- Adultos e Crianças
- Gotas: 1 a 2 gotas de 2/2 hs nos olhos.
- Pomada: 1,5 cm de 6/6 hs nos olhos.

Precauções

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO Este medicamento é de uso EXCLUSIVAMENTE OFTÁLMICO NÃO DEVE SER INJETADO Alguns pacientes podem apresentar sensibilidade (alergia) aos aminoglicosídeos quando aplicados topicamente Se ocorrer qualquer reação de sensibilidade, o uso do medicamento deve ser suspenso O uso prolongado de esteroides pode resultar em glaucoma (aumento da pressão intraocular), com dano ao nervo óptico, alteração na acuidade visual e campo visual e formação de catarata subcapsular posterior A pressão intraocular deve ser rotineiramente avaliada mesmo que isso seja difícil em crianças e em pacientes que não colaboram O uso prolongado pode suprimir a resposta do hospedeiro e, portanto, aumentar o risco de infecções oculares secundárias Nas doenças que causam o afinamento da córnea ou da esclera são 2 conhecidos casos de perfuração com o uso de esteroides tópicos Em condições purulentas agudas do olho, os esteroides podem mascarar a infecção ou exacerbar as existentes A pomada oftálmica pode retardar a cicatrização da córnea Deve-se considerar a possibilidade de infecções micóticas da córnea após administração prolongada de esteroides O uso prolongado de quaisquer antibióticos pode resultar no desenvolvimento de microrganismos resistentes, inclusive fungos No caso de superinfecção deve-se instituir a terapia adequada Pode ocorrer sensibilidade cruzada a outros antibióticos aminoglicosídeos: caso ocorra hipersensibilidade a este produto, interromper o uso e instituir terapia apropriada Uso durante a gravidez e lactação Não existem estudos adequados ou bem-controlados em mulheres grávidas que utilizam este medicamento TOBRACORT deve ser utilizado durante a gravidez somente se o benefício potencial para a mãe justificar o risco potencial ao embrião ou ao feto Corticosteroides administrados por via sistêmica aparecem no leite humano e podem suprimir o crescimento, interferir na produção endógena de corticosteroides ou causar outros efeitos adversos Não se sabe se a administração tópica de corticosteroides pode resultar em absorção sistêmica suficiente para produzir quantidades detectáveis no leite humano Como muitas drogas são excretadas no leite humano, recomenda-se ter cuidado quando TOBRACORT for administrado a uma mulher lactante Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista Uso em crianças Não foram determinadas a segurança e a eficácia do uso em crianças com menos de 2 anos de idade O risco de aumento da pressão intraocular induzida por corticosteroides pode ser maior em crianças e pode ocorrer mais cedo do que em adultos Pacientes idosos não foram observadas diferenças de eficácia e segurança entre pacientes idosos e mais jovens Pacientes que utilizam lentes de contato Este medicamento contém um conservante que pode ser absorvido pelas lentes de contato As lentes de contato devem ser removidas do olho antes da aplicação do produto e podem ser recolocadas 15 minutos após a aplicação Pacientes que fazem uso de mais de um medicamento oftálmico Se usar mais de um colírio, estes devem ser administrados com um intervalo de no mínimo 10 minutos entre cada um Pacientes com insuficiência renal (rim) ou hepática (fígado) Não há estudos que assegurem a segurança no uso do medicamento em pacientes com insuficiência renal ou hepática e deve ser utilizado com precaução nestes pacientes TOBRACORT não é indicado no tratamento de pacientes que sofrem de insuficiência renal, pois seus metabólitos são excretados pelo rim Interferência na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas (Depois de passar TOBRACORT a visão pode ficar temporariamente embaçada, durante este período não se deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA USO OFTÁLMICO Não deve ser injetado Alguns pacientes podem apresentar sensibilidade aos aminoglicosídeos quando aplicados topicamente Se ocorrer qualquer reação de sensibilidade, o uso do medicamento deve ser suspenso O uso prolongado de esteroides pode resultar em glaucoma (aumento da pressão intraocular), com dano ao nervo óptico, alteração na acuidade visual e campo visual e formação de catarata subcapsular posterior A pressão intraocular deve ser rotineiramente avaliada mesmo que isso seja difícil em crianças e em pacientes que não colaboram O uso prolongado pode suprimir a resposta do hospedeiro e, portanto, aumentar o risco de infecções oculares secundárias Nas doenças que causam o afinamento da córnea ou da esclera são conhecidos casos de perfuração com o uso de esteroides tópicos Em condições purulentas agudas do olho, os esteroides podem mascarar a infecção ou exacerbar as existentes O conservante presente no medicamento, cloreto de benzalcônio, pode ser absorvido pelas lentes de contato gelatinosas Não utilizar este medicamento com lentes de contato nos olhos Deve-se considerar a possibilidade de infecções micóticas da córnea após administração prolongada de esteroides O uso prolongado de quaisquer antibióticos pode resultar no desenvolvimento de microrganismos resistentes, inclusive fungos No caso de superinfecção deve-se instituir a

000827

[Handwritten signature]

Garhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido!



QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR Assim como qualquer medicamento, podem ocorrer reações indesejáveis com a aplicação do TOBRACORT®

As seguintes reações adversas são classificadas de acordo com a seguinte convenção: muito comum (ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento); comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento); incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento); rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento); ou muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento) Dentro de cada grupo de frequência, as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade. Distúrbios oculares Incomum: aumento da pressão intraocular, dor nos olhos, coceira nos olhos, desconforto nos olhos, irritação nos olhos e/ou inflamação da córnea, alergia nos olhos, visão borrada, olho seco, vermelhidão nos olhos. Distúrbios gastrointestinais Raro: diminuição do senso do paladar. Outras reações adversas identificadas a partir da vigilância pós-comercialização, incluem o seguinte (as frequências não puderam ser estimadas a partir dos dados disponíveis): Distúrbios oculares Inchaço e vermelhidão na pálpebra, dilatação da pupila, aumento da produção de lágrimas. Distúrbios do sistema imune Hipersensibilidade (alergia) Distúrbios gastrointestinais Náusea, desconforto abdominal 4 Distúrbios do sistema nervoso Tontura e dor de cabeça Doenças de pele e tecidos subcutâneos Inflamação da pele, inchaço na face e coceira Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento 9 0

QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTA MEDICAMENTO Em caso de superdose você deve lavar os olhos com água morna em abundância, interromper o tratamento e consultar imediatamente o seu médico. Devido às características da presente preparação, nenhum efeito tóxico é previsto com uma superdose ocular deste produto, nem em caso de ingestão acidental do conteúdo de uma bisnaga. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA** Registro MS – 1 0497 1305 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A Rua Cel Luiz Tenório de Brito, 90 Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-000 CNPJ 60 665 981 0007-03 Indústria Brasileira Farm Resp: Florentino Jesus Krenkas CRF-SP nº 49136 Fabricado na unidade fabril, Trecho 1, Conjunto 11, Lotes 01/2 Polo de Desenvolvimento JK Brasília – DF – CEP: 72549-555 CNPJ: 60 665 981 0007-03 Indústria Brasileira SAC 0800 11 1559 TOBRACORT (tobramicina + dexametasona) União Química Farmacêutica Nacional S/A Suspensão oftálmica estéril 3 mg/mL + 1 mg/mL 1 TOBRACORT (tobramicina + dexametasona) Suspensão oftálmica estéril MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO


As seguintes reações adversas são classificadas de acordo com a seguinte convenção: muito comum (ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento); comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento); incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento); rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento); ou muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento) Dentro de cada um-grupo de frequência, as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade. Distúrbios oculares Incomum: aumento da pressão intraocular, dor nos olhos, coceira nos olhos, desconforto nos olhos, irritação nos olhos. Raro: inflamação da córnea, alergia nos olhos, visão borrada, olho seco, vermelhidão nos olhos 4 Distúrbios gastrointestinais Raro: diminuição do senso do paladar. Outras reações adversas identificadas a partir da vigilância pós comercialização, incluem o seguinte (as frequências não puderam ser estimadas a partir dos dados disponíveis): Distúrbios oculares Inchaço e vermelhidão na pálpebra, dilatação da pupila, aumento do lacrimejamento. Distúrbio do sistema imune Hipersensibilidade (alergia) Distúrbios gastrointestinais Náusea, desconforto abdominal Distúrbios do sistema nervoso Tontura e dor de cabeça Doenças de pele e tecidos subcutâneos Inflamação da pele, inchaço na face e coceira Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento 9 0 **QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTA MEDICAMENTO** Em caso de superdose você deve lavar os olhos com água morna em abundância, interromper o tratamento e consultar imediatamente o seu médico. Devido às características da presente preparação, nenhum efeito tóxico é previsto com uma superdose ocular deste produto, nem em caso de ingestão acidental do conteúdo de um frasco. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA** Registro MS – 1 0497 1305 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A Rua Cel Luiz Tenório de Brito, 90 Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-000 CNPJ 60 665 981 0007-03 Indústria Brasileira Farm Resp: Juliana dos Santos Scarpa CRF-MG nº 18052 Fabricado na unidade fabril, Avenida Professor Cláudio Gomes de Oliveira, 4 550 Bairro São Cristóvão Pouso Alegre – MG – CEP: 37550-000 CNPJ: 60 665 981 0005-41 Indústria Brasileira SAC 0800 11 1559 5 Anexo B Formulário de Alteração para a Bula Dados da submissão eletrônica Dados da petição/modificação que altera bula Dados das alterações de bulas Data do Expediente Nº do expediente Assunto Data do expediente Nº do expediente Assunto Data de aprovação Itens de Bula Versões (VP / VPS)

Composição

COMPOSIÇÃO Cada grama contém tobramicina 3 mg dexametasona 1 mg Veículo: clorobutanol, petrolato líquido e petrolato branco **INFORMAÇÕES AO PACIENTE 1**

COMPOSIÇÃO Cada mL (30 gotas/mL) contém: tobramicina 3 mg (0,10 mg/gota) dexametasona 1 mg (0,03 mg/gota) Veículo: clorato de benzalcônio, clorato de sódio, tiloxapol, hietelose, sulfato de sódio, edetato dissódico, ácido clorídrico e água para injetáveis **INFORMAÇÕES AO PACIENTE 1**

Interação Medicamentosa



Interação Alimentícia

Não há relatos até o momento.

Ação da Substância

Resultados da eficácia

Estudo prospectivo randomizado com 284 olhos (142 pacientes) foi realizado para comparar a eficácia da combinação de cloranfenicol / betametazona gel administrada 3 vezes ao dia e a combinação de tobramicina / dexametasona colírio administrado 4 vezes ao dia em pacientes submetidos a cirurgia de catarata.

Os autores observaram eficácia semelhante das duas formulações com relação ao controle da pressão intraocular pós-operatória, redução do edema corneano ou palpebral, redução da hiperemia da conjuntiva no pós-operatório.

A sensação subjetiva de dor local e sensação de olho seco foram mínimas e comparáveis nos dois grupos avaliados.

Os autores Cornesasca e Bianchi concluíram que ambas medicações apresentaram eficácia, tolerabilidade e aceitabilidade semelhantes em pacientes submetidos a cirurgia de catarata.

Em outro estudo duplo cego, randomizado e comparativo realizado por Nottivol e Berin foram avaliados 271 pacientes submetidos a cirurgia de catarata. Estes pacientes foram divididos em 3 grupos que receberam de forma aleatória colírio de Tobramicina/Dexametasona ou Neomicina-Polimixina B e Dexametasona ou Sulfato de Neomicina.

O principal critério de eficácia foi a ocorrência de inflamação intraocular através da contagem de células no humor aquoso e flare. Todos os pacientes foram examinados no pós-operatório, 3, 8, 14 e 21 dias de pós-operatório. Os autores concluíram que não houve diferença significativa na eficácia e tolerabilidade das formulações avaliadas.

Características Farmacológicas

Os corticoides atuam suprimindo a resposta inflamatória a uma variedade de agentes e provavelmente retardam o processo de cicatrização.

Como os corticoides podem inibir o mecanismo de defesa orgânica contra infecção, pode ser aconselhável o uso concomitante de um antimicrobiano se esta inibição for considerada clinicamente significativa. A dexametasona é um potente corticoide.

O componente antibiótico da associação (tobramicina) é incluído para agir contra organismos sensíveis. Os estudos in vitro têm demonstrado que a tobramicina é ativa contra cepas sensíveis dos seguintes microrganismos:

- Estafilococos, inclusive *S. aureus* e *S. epidermidis* (coagulase-positivos e coagulase-negativos), inclusive cepas resistentes a penicilina.
- Streptococos, inclusive algumas espécies do Grupo A, beta-hemolíticos, algumas espécies não hemolíticas e algumas cepas de *Streptococcus pneumoniae*.
- *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter aerogenes*, *Proteus mirabilis*, *Morganella morganii* e a maioria das cepas de *Franseria sulzgaris*, *Haemophilus influenzae* e *H. aegyptius*, *Moraxella lacunata* e *Acinetobacter calcoaceticus* e algumas espécies de *Neisseria*.

Os estudos de sensibilidade bacteriana demonstram que, em alguns casos, os microrganismos resistentes à gentamicina permanecem susceptíveis à tobramicina.

Nenhum dado sobre a extensão da absorção sistêmica de tobramicina + dexametasona suspensão oftálmica está disponível, porém sabe-se que alguma absorção sistêmica pode ocorrer com drogas de aplicação ocular.

Se a dose máxima da tobramicina + dexametasona suspensão oftálmica for administrada nas primeiras 48 horas (duas gotas em cada olho a cada 2 horas) e ocorrer absorção sistêmica completa, o que é muito improvável, a dose diária de dexametasona seria de 2,4 mg. A dose fisiológica de reposição normal é de 0,75 mg por dia. Se tobramicina + dexametasona suspensão oftálmica for administrado após as primeiras 48 horas, duas gotas em cada olho a cada 4 horas, a dose administrada de dexametasona seria de 1,2 mg por dia.

Cuidados de Armazenamento

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C), proteger da luz. O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho). Número de lote e datas de fabricação e validade, vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Aspecto físico: pomada levemente amarelada. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C), proteger da luz. O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho). Número de lote e datas de fabricação e validade, vide embalagem. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido*

11 828



Search bar with magnifying glass icon

Princípio Ativo Dexametasona + Tobramicina


Bula [Veja a bula](#)

Registro MS 1049713050029

Tipo do medicamento Similar Equivalente

Avaliação dos clientes

Nenhuma avaliação disponível



[Avalie esse produto e ajude outros compradores :\)](#)

Institucional

- [Nossa história](#)
- [Trabalhe Conosco](#)
- [Responsabilidade](#)

Benefícios

- [Ofertas do mês](#)
- [Farmácia Popular](#)

Privacidade

- [Termo de Uso](#)
- [Política de Privacidade](#)

Serviços

- [Bulário Anvisa](#)
- [Nossas Lojas](#)
- [Programa de Relacionamento Drogal Mais](#)
- [Entrega Expressa](#)
- [Manipulação](#)
- [Momento Saúde](#)
- [Óptica Drogal](#)
- [Cartão Drogal Mais](#)
- [Testes Rápidos](#)
- [Fornecedores](#)

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido*



Search bar with magnifying glass icon

Convênio Drogal

Acompanhe nossas redes sociais



Atendimento ao cliente
0800 771 2120

Entre em contato
sac@drogal.com.br

Agendamento Teste COVID

Compre pelo telefone
0800 347 0000

Informações Cartão Drogal Mais
Clique aqui

Formas de pagamento



Segurança



Qualidade e Responsabilidade Social

Drogal Farmacéutica LTDA | CNPJ: 54.375.647/0066-72 | IE: 535.412.860.112 | Rua São João, 909 - Bairro Alto - Piracicaba/São Paulo, CEP: 13416-585 | Farmacéutica responsável: Juliane Stenico - CRF/SP 42.793 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Para mais informações, consulte o site Anvisa. As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. Promoções e preços são válidos apenas para compras on-line, caso haja disponibilidade e estão sujeitos a alterações no decorrer do dia. Os preços publicados no site são válidos apenas para compras on-line. | Drogal Farmacéutica LTDA - 2623 Todos os direitos reservados.

000829

8/8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.375.647/0066-72 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/04/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DROGAL FARMACEUTICA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGAL PIRACICABA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SAO JOAO	NÚMERO 909	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 13.416-585	BAIRRO/DISTRITO ALTO	MUNICÍPIO PIRACICABA	UF SP
-------------------	-------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DROGAL.COM.BR	TELEFONE (19) 3433-9300/ (19) 3429-1200
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/04/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2023 às 15:13:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



000830




O que deseja encontrar?



Início > Medicamentos > Remédios > Para A Visão > Tobracort Tobramicina 3mg/G + Dexamet

< Voltar

♥ Favoritar



TOBRACORT TOBRAMICINA 3MG/G + DEXAMETASONA 1MG/G POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL 3,5G

Genom

3,5g Pomada Oftálmica Estéril

TOBRAMICINA, DEXAMETASONA

0 de ★ ★ ★ ★ ★ (0)

Venda sujeita a envio antecipado e/ou retenção da receita médica original

TOBRACORT É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.



Sobre o Produto

Tobracort é indicado nas condições inflamatórias oculares sensíveis a esteroide e onde exista infecção ocular bacteriana superficial ou o risco de infecção ocular bacteriana. Os esteroides oculares são indicados nas condições inflamatórias da conjuntiva palpebral e bulbar, córnea e segmento anterior do globo ocular, onde se aceita o risco inerente ao uso de esteroides em certas conjuntivites infecciosas para se obter diminuição do edema e da inflamação. Tobracort é indicado também, na uveíte anterior crônica e traumas na córnea causados por queimaduras químicas, térmicas ou por radiação, e em casos de corpos estranhos. O uso de uma droga associada a um componente anti-infeccioso é indicado onde o risco de infecção superficial ocular é alto ou onde se supõe que um número de bactérias potencialmente perigoso estará presente no olho.

TOBRACORT É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

Características


SKU	50947
EAN	7896006290537
Peso (kg)	0.0010
Quantidade	3,5g Pomada Oftálmica Estéril
Marca	<u>Genom</u>
Fabricante	<u>Genom</u>
Link Bula	<u>Leia a bula</u>
MS	1049713050029
Princípio Ativo Novo	<u>TOBRAMICINA, DEXAMETASONA</u>
Dosagem	3mg/g + 1mg/g

000829

R\$ 40,73

QUANTIDADE

R\$ 37,38 - 1 +



TOBRACORT TOBRAMICINA 3MG/G + DEXAMETASONA 1MG/G POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL 3,5G

Genom
3,5g Pomada Oftálmica Estéril



O que deseja encontrar?

Assinatura

Cláudia ou Luiza
Mishel Costa

Meus Pedidos

TOBRACORT É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO. INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Comprar

[Adicionar aos favoritos](#)

000832



Quem comprou este produto se interessou também por

https://www.drogaia.com.br/medicamentos/oftalmicos/dewes-5mg-ml-solucao-oftalmica-com-10ml-genom-10ml-solucao-oftalmica-0-de-5-estrelas-0-0

Dewes 5mg/ML Solução Oftálmica Com 10ml

Genom

10ml Solução Oftálmica

0 de 5 ★ ★ ★ ★ ★ (0)

Quem viu esse produto, também viu

https://www.drogaia.com.br/medicamentos/oftalmicos/dewes-5mg-ml-solucao-oftalmica-com-10ml-genom-10ml-solucao-oftalmica-0-de-5-estrelas-0-0

Demaquilante Blephagel Gel 40g

Genom

40g Gel

0 de 5 ★ ★ ★ ★ ★ (0)

Mais vendidos da categoria

Soro Fisiológico Cloreto De Sódio 0,9% Needs 500ml

Needs


500ml Solução

0 de 5 ★ ★ ★ ★ ★ (0)

000833

Veja avaliações de quem já comprou

As avaliações são coletadas por e-mail após a entrega do produto e auditadas pela Trustvox que certifica que as opiniões são reais.



Central de Atendimento

3003-7242

Horário de atendimento das 7h às 21h,
de segunda a domingo.



Televendas

3003-7242

Horário de atendimento das 7h às 21h,
de segunda a domingo.

Privacidade de dados
Como protegemos seus dados
Política de Privacidade
Portal do Titular dos Dados

A Droga Raia segue as determinações da





000834



A Droga Raia segue as determinações da



Forma de Pagamento



Site Seguro



Raia Droga S.A. | DROGA RAIA | Fone: 0800 700 222 | E-mail: Raia@raia.com.br | Endereço: Rua da Bandeira, 108 | Juruá | São Paulo | CEP: 05359-001 | Horário de Atendimento: Segunda a Domingo das 7h às 23h | 0800-700-2222 | Horário de Atendimento: Terças-feiras: 08h às 22h, Segundas e Domingos: 7h às 21h | Raia Atendimento ao Cliente: 0800-700-2222, Duvidas, pedidos e reclamações: raia@droga.com.br. De Segunda a Domingo das 08h às 21h, inclusive feriados. | Farmacologia responsável: Rua Rosa Duarte Marques | CEP: 42.430-140 | Fone: 0800-700-2222 | 0800-700-2222. | 7. As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e, não substituindo, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional de saúde médica. Somente o médico é capaz de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao pesquisar no site, seu médico deverá ser consultado. De genes e proteínas envolvidas em doenças genéticas, não se trata de diagnóstico, mas sim de testes genéticos para detectar falhas genéticas. Mais informações, consulte o site: www.anvisa.gov.br. A Raia Droga S.A. trabalha com as tecnologias mais avançadas de proteção de dados, para que você possa realizar seus compras com tranquilidade. A privacidade e a segurança dos clientes são compromissos da Raia Droga S.A. Todos os pedidos efetuados estão sujeitos a confirmação da disponibilidade do produto em nosso estoque.

000835



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.585.865/0240-93 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/2003
NOME EMPRESARIAL RAIA DROGASIL S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO	NÚMERO 638	COMPLEMENTO *****
CEP 05.359-001	BAIRRO/DISTRITO VILA BUTANTA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCALLEGALIZACAO@RD.COM.BR	
TELEFONE (11) 3769-5678		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2023 às 15:16:39 (data e hora de Brasília).


Página: 1/1

000836

1/2

**Item 75: Valproato de Sódio
250mg comprimido**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

000837 



O que você busca?

- Início
- Medicamentos
- Sistema Nervoso
- Convulsão



Acido Valproico 250Mg 25 Comprimidos

Código: 467269 [Biolab](#)

12% de desconto

Ácido Valproico Biolab Genéricos, para o que é indicado e para o que serve?

Epilepsia
 Ácido Valproico é indicado isoladamente ou em combinação a outros medicamentos, no tratamento de pacientes adultos e crianças acima de 10 anos com crises parciais complexas, que ocorrem tanto de forma isolada ou em associação com outros tipos de crises. Também é indicado isoladamente ou em combinação a outros medicamentos no tratamento de quadros de ausência simples e complexo em pacientes adultos e crianças acima de 10 anos, e como terapia adjuvante em adultos e crianças acima de 10 anos com crises de ausência típica, em estabilização da frequência.

R\$ 19,74 + 10% = 21,714
 - 0,7896
R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas
 Por determinação da portaria 44/2003 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.
 Compre este medicamento em uma de nossas lojas*
 Ácido Valproico 250Mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia o bulo.

[Nossas Lojas](#)

*Consulte a disponibilidade do produto na loja

Distúrbios do ciclo da ureia (DCU) – desordem genética rara que pode resultar em acúmulo de amônia no sangue;

Porfiria – distúrbio genético raro que afeta parte da hemoglobina do sangue.

Como usar o Ácido Valproico Biolab Genéricos? :

As cápsulas de Ácido Valproico deverão ser engolidas inteiras, sem mastigar, para evitar irritação local da boca e garganta.

Crianças e adolescentes do sexo feminino e mulheres em idade fértil

A terapia com ácido valproico deve ser iniciada e supervisionada por um médico especialista. O tratamento com ácido valproico somente deve ser iniciado em crianças e adolescentes do sexo feminino e mulheres em idade fértil se outros tratamentos alternativos forem ineficazes ou não tolerados pelas pacientes. O ácido valproico deve ser prescrito e dispensado em conformidade com as medidas de prevenção à gravidez, conforme descrito no item "Quais as contraindicações do Ácido Valproico Biolab Genéricos?" e "Quais cuidados devo ter ao usar o Ácido Valproico Biolab Genéricos?". A dose diária deve ser dividida em, pelo menos, 2 doses individuais.

Epilepsia

Dose inicial recomendada

10-15 mg/kg/dia (única exceção nas crises de ausência = 15mg/kg/dia). A dose deve ser aumentada, pelo médico, de 5 a 10 mg/kg/semana até a obtenção da resposta desejada, administrados em doses diárias divididas (2 a 3 vezes ao dia) para alguns pacientes.

Dose máxima recomendada

60 mg/kg/dia.

Em caso de uso conjunto com outros medicamentos antiepilépticos, as dosagens desses podem ser reduzidas pelo médico em aproximadamente 25% a cada duas semanas. Esta redução pode ser iniciada no começo do tratamento com ácido valproico ou atrasada por uma a duas semanas em casos em que exista a preocupação de ocorrência de crises com a redução. A velocidade e duração desta redução do medicamento antiepiléptico concomitante pode ser muito variável e os pacientes devem ser monitorados rigorosamente durante este período com relação a aumento da frequência das convulsões. Se a dose total diária exceder 250 mg, ela deve ser administrada de forma dividida. Seu médico dará a orientação necessária para o seu tratamento.

Interrupção do tratamento

Os anticonvulsivantes não devem ser descontinuados abruptamente nos pacientes para os quais estes fármacos são administrados para prevenir convulsões generalizadas, pois há grande possibilidade de precipitar um estado de mal epilético, com subsequente má oxigenação cerebral e risco de morte. A interrupção repentina do tratamento com este medicamento cessará o efeito terapêutico, o que poderá ser prejudicial ao paciente devido às características da doença para a qual este medicamento está indicado.

Medicamentos antiepilépticos não deverão ser descontinuados abruptamente em pacientes nos quais o medicamento é administrado para prevenir crises mais graves, devido à alta possibilidade de desenvolvimento de estado epilético com falta de oxigênio e risco à vida.

O quadro a seguir é um guia para administração da dose diária inicial de Ácido Valproico 15 mg/kg/dia considerando a administração a cada 8 horas:

Peso (Kg)	Dose total diária (mg)	Número de cápsulas 250mg		
		Primeira dose do dia (ex.: 7 horas)	Segunda dose do dia (ex.: 15 horas)	Terceira dose do dia (ex.: 23 horas)
10-24,9	250	0	0	1
25-39,9	500	1	0	1
40-59,9	750	1	1	1
60-74,9	1000	1	1	2
75-90,0	1250	2	1	2

R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas?

Ácido Valproico 250mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

 **Nossas Lojas**

*Consulte a disponibilidade do produto na loja

Recomenda-se fazer a contagem de plaquetas e realização de testes de coagulação antes de iniciar o tratamento e depois, pois pode haver alteração nas plaquetas e coagulação sanguínea. O aparecimento de hemorragia, manchas roxas e desordem na capacidade natural de coagulação do paciente são indicativos para a redução da dose ou interrupção da terapia.

Ácido valproico pode interagir com medicamentos administrados concomitantemente.

Hepatotoxicidade (toxicidade do fígado) / Disfunção hepática

Houve casos fatais de insuficiência do fígado em pacientes recebendo ácido valproico, usualmente durante os primeiros seis meses de tratamento. Deve-se ter muito cuidado quando o medicamento for administrado em pacientes com história anterior de doença no fígado. Toxicidade no fígado grave ou fatal pode ser precedida por sintomas não específicos, como mal-estar, fraqueza, estado de apatia, inchaço facial, falta de apetite e vômito. Pacientes em uso de múltiplos anticonvulsivantes, crianças, pacientes com doenças metabólicas congênitas, com doença convulsiva grave associada a retardo mental e pacientes com doença cerebral orgânica podem ter um risco particular de desenvolver toxicidade no fígado. A experiência em epilepsia tem indicado que a incidência de hepatotoxicidade fatal diminui consideravelmente, de forma progressiva, em pacientes mais velhos. O medicamento deve ser descontinuado imediatamente na presença de disfunção do fígado significativa, suspeita ou aparente. Em alguns casos, a disfunção do fígado progrediu apesar da descontinuação do medicamento. Na presença destes sintomas, o médico deve ser imediatamente procurado.

Pancreatite (Inflamação do pâncreas)

Pacientes e responsáveis devem estar cientes que dor abdominal, enjoo, vômito e/ou falta de apetite, podem ser sintomas de pancreatite. Na presença destes sintomas, deve-se procurar o médico imediatamente, pois casos de pancreatite envolvendo risco à vida foram relatados tanto em crianças como em adultos que receberam ácido valproico. Alguns casos ocorreram logo após o início do uso, e outros após vários anos de uso. Houve casos nos quais a pancreatite recorreu após nova tentativa com ácido valproico.

Pacientes com suspeita ou conhecida doença mitocondrial

Insuficiência hepática aguda induzida por valproato e mortes relacionados à doença hepática têm sido reportadas em pacientes com síndrome neurometabólica hereditária causada por mutação no gene da DNA polimerase γ (POLG, ou seja, Síndrome de Alpers-Huttenlocher) em uma taxa maior do que aqueles sem esta síndrome.

Deve-se suspeitar de distúrbios relacionados à POLG em pacientes com histórico familiar ou sintomas sugestivos de uma distúrbio relacionada à POLG, incluindo, mas não limitado a encefalopatia inexplicável, epilepsia refratária (focal, mioclônica), estado de mal epilético na apresentação, atrasos no desenvolvimento, regressão psicomotora, neuropatia sensoriomotora axonal, miopatia, ataxia cerebelar, oftalmoplegia, ou migrânea complicada com aura occipital. O teste para mutação de POLG deve ser realizado de acordo com a prática clínica atual para avaliação diagnóstica dessa distúrbio.

Em pacientes maiores de 2 anos com suspeita clínica de distúrbio mitocondrial hereditária o ácido valproico deve ser usado apenas após tentativa e falha de outro anticonvulsivante. Este grupo mais velho de pacientes deve ser monitorado durante o tratamento com ácido valproico para desenvolvimento de lesão hepática aguda com avaliação clínica regular e monitoramento dos testes de função hepática.

Comportamento e ideação suicida

Pacientes tratados com ácido valproico devem ser monitorados para emergências ou piora da depressão, pensamentos sobre automutilação, comportamento ou pensamentos suicidas e/ou qualquer mudança incomum de humor ou comportamento. Ideação suicida pode ser uma manifestação de transtornos psiquiátricos preexistentes e pode persistir até que ocorra remissão significativa dos sintomas. Existem relatos de aumento no risco de pensamentos e comportamentos suicidas nestes pacientes. Este risco foi observado logo uma semana após o início do tratamento medicamentoso com os antiepilépticos e persistiu durante todo o período em que o tratamento foi avaliado. A supervisão de pacientes de alto risco deve acontecer durante a terapia medicamentosa inicial.

Comportamentos suspeitos devem ser informados imediatamente aos profissionais de saúde.

Trombocitopenia (diminuição no número de plaquetas no sangue)

A trombocitopenia pode estar relacionada à dose. O benefício terapêutico que pode acompanhar as maiores doses deverá ser considerado pelo seu médico contra a possibilidade de maior incidência de eventos adversos.

Hiperamonemia (excesso de amônia no organismo)

Foi relatado o excesso de amônia em associação com a terapia com ácido valproico e pode estar presente mesmo com testes de

R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas*

Ácido Valproico 250mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

 **Nossas Lojas**

*Consulte a disponibilidade do produto na loja

Atrofia Cerebral / Cerebelar

Houve relatos pós-comercialização de atrofia (reversível e irreversível) cerebral e cerebelar, temporariamente associadas ao uso de produtos que se dissociam em íon valproato. Em alguns casos, porém, a recuperação foi acompanhada por sequelas permanentes. Foi observado prejuízo psicomotor e atraso no desenvolvimento, entre outros problemas neurológicos, em crianças com atrofia cerebral decorrente da exposição ao valproato quando em ambiente intrauterino. As funções motoras e cognitivas dos pacientes devem ser monitoradas rotineiramente e o medicamento deve ser descontinuado nos casos de suspeita ou de aparecimento de sinais de atrofia cerebral.

Reação de hipersensibilidade de múltiplos órgãos

Foram raramente relatadas após o início da terapia com o ácido valproico em adultos e crianças. Os pacientes tipicamente, mas não exclusivamente, apresentaram febre e reações de sensibilidade na pele, com envolvimento de outros órgãos do corpo. Outras manifestações associadas podem incluir aumento dos gânglios, inflamação do fígado (hepatite), anormalidade de testes de função do fígado, anormalidades no sangue, coceira, inflamação nos rins, diminuição do volume de urina, síndrome hepatorenal (envolvendo o fígado e os rins), dor nas articulações e fraqueza. Como o distúrbio é variável em sua expressão, sinais e sintomas de outros órgãos não relacionados aqui podem ocorrer. Se houver suspeita desta reação, o ácido valproico deve ser interrompido e um tratamento alternativo ser iniciado pelo médico. Este medicamento contém propilparabeno E216 e metilparabeno E218 que podem causar reações alérgicas (possivelmente retardadas).

Agravamento das convulsões

Assim como outras drogas antiepilépticas, alguns pacientes ao invés de apresentar uma melhora no quadro convulsivo, podem apresentar uma piora reversível da frequência e severidade do quadro convulsivo (incluindo o estado epilético) ou também o aparecimento de novos tipos de convulsões com valproato. Em caso de agravamento das convulsões, aconselha-se consultar o seu médico imediatamente.

Aumento do risco de câncer

Não é conhecido até o momento.

Aumento do risco de mutações

Houve algumas evidências de que a frequência de aberrações cromossômicas poderia estar associada com epilepsia.

Fertilidade

A administração de ácido valproico pode afetar a fertilidade em homens. Foram relatados casos que indicam que as disfunções relacionadas à fertilidade são reversíveis após a descontinuação do tratamento. Amenorreia (ausência de menstruação), ovários policísticos e níveis de testosterona elevados foram relatados em mulheres.

Capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

Uma vez que este medicamento pode produzir alteração do sistema nervoso central, especialmente quando combinado com outras substâncias com efeito semelhante por exemplo, álcool, os pacientes não devem realizar tarefas de risco, como dirigir veículos ou operar máquinas perigosas, até que se tenha certeza de que estes pacientes não ficam sonolentos com o uso do medicamento.

Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Ácido Valproico Biolab Genéricos?

A classificação da frequência das reações adversas deve seguir os seguintes parâmetros.

Frequência das Reações Adversas		Parâmetros
≥ 1/10 (≥10%)		Muito comum
≥ 1/100 e < 1/10 (≥ 1% e < 10%)		Comum (frequente)
≥ 1/1.000 e < 1/100 (≥ 0,1% e < 1%)		Incomum (infrequente)
≥ 1/10.000 e < 1/1.000 (≥ 0,01% e < 0,1%)		Rara
< 1/10.000 (< 0,01%)		Muito rara
Não pode ser estimada		Desconhecida
Sistemas	Frequência	Reação adversa

R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas*

Ácido Valproico 250mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

 **Nossas Lojas**

*Consulte a disponibilidade do produto nas lojas

000839

	Desconhecida	Aumento de bilirrubina sérica ¹ , diminuição de carnitina, anormalidade do teste de função da tireoide
	Muito comum	Sonolência, tremor
	Comum	Amnésia, ataxia, tontura, disgeusia, cefaleia, nistagmo, parestesia, alteração da fala
Alteração do sistema nervoso	Incomum	Afasia, incoordenação motora, disartria, distonia, encefalopatia ² , hiperkinesia, hiperreflexia, hipertonia, hipoestesia, hiporreflexia, convulsão ³ , estupor, discinesia tardia, alteração na visão
	Desconhecida	Asterixis, atrofia cerebelar ⁴ , atrofia cerebral ⁴ , desordem cognitiva, coma, desordem extrapiramidal, distúrbio de atenção, deficiência da memória, parkinsonismo, hiperatividade psicomotora, habilidades psicomotoras prejudicadas, sedação ⁵
	Comum	Zumbido no ouvido
Alteração do labirinto e ouvido	Incomum	Surdez ⁶ , distúrbio auditivo, hiperacusia, vertigem
	Desconhecida	Dor de ouvido
Alteração respiratória, torácica e mediastino	Incomum	Tosse, dispneia, disfonia, epistaxe
	Desconhecida	Efusão pleural
	Muito comum	Náusea ⁷
	Comum	Dor abdominal, constipação, diarreia, dispepsia ⁷ , flatulência, vômitos ⁷
Alteração gastrointestinal	Incomum	Incontinência anal, alteração anorretal, mau hálito, boca seca, disfagia, eructação, sangramento gengival, glossite, hematêmese, melena, pancreatite ⁸ , tenesmo retal, hipersecreção salivar
	Desconhecida	Distúrbios gengivais, hipertrofias gengivais, aumento da glândula parótida
Alteração urinária e renal	Incomum	Hematuria, urgência em urinar, poliúria, incontinência urinária
	Desconhecida	Enurese, síndrome de Fanconi ⁹ , falência renal, nefrite do túbulo intersticial
	Comum	Alopecia ¹⁰ , equimose, prurido, rash cutâneo
	Incomum	Acne, dermatite esfoliativa, pele seca, eczema, eritema nodoso, hiperidrose, alteração na unha, petéquias, seborreia
Alteração nos tecidos e pele	Desconhecida	Vasculite cutânea, síndrome de hipersensibilidade sistêmica a drogas (Síndrome DRESS ou SHSD), eritema multiforme, alteração do cabelo, alteração do leito ungueal, reação de fotossensibilidade, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica
	Incomum	Espasmo muscular, convulsão muscular, fraqueza muscular
Alteração de tecidos conectivos e muscular esquelético	Desconhecida	Diminuição da densidade óssea, dor óssea, osteopenia, osteoporose, rabdomiólise, lúpus eritematoso sistêmico
Alteração endócrina	Desconhecida	Hiperandrogenismo ¹¹ , hipotireoidismo, secreção inapropriada de hormônio antidiurético
	Comum	Diminuição do apetite, Aumenta do apetite
Alteração do metabolismo e nutrição	Incomum	Hipercalernia, hipernatremia, hipoglicemia, hiponatremia, hipoproteïnemia
	Desconhecida	Deficiência de biotina, dislipidemia, hiperamonemia, resistência à insulina, obesidade
Neoplasias benignas, malignas e não específicas (incluem cistos e pólipos)	Incomum	Hemangioma de pele
	Desconhecida	Síndrome mielodisplásica

R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas*

Acido Valproico 250Mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia o bula.

Nossas Lojas

*Consulte a disponibilidade do produto na loja

Alteração cardíaca	Incomum	Bradicardia, parada cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, taquicardia
	Comum	Ambliopia, diplopia
Alteração nos olhos	Incomum	Cromatopsia, olho ressecado, distúrbio ocular, dor nos olhos, desordem da lacrimal, miose, fotofobia, deficiência visual
Alteração do sistema imunológico	Desconhecida	Reação anafilática, hipersensibilidade
	Comum	Infecção
Infecção e infestações	Incomum	Bronquite, furúnculo, gastroenterite, herpes simples, gripe, rinite, sinusite
	Desconhecida	Otite média, pneumonia, infecção do trato urinário
Lesão, intoxicação e complicações processuais	Comum	Lesão

¹ Pode refletir em uma potencial hepatotoxicidade séria.

² Encefalopatia com ou sem febre foi identificada pouco tempo após a introdução de monoterapia com ácido valproico sem evidência de disfunção hepática ou altos níveis plasmáticos inapropriados de valproato. Apesar da recuperação ser efetiva com a descontinuação do medicamento, houve casos fatais em pacientes com encefalopatia hiperamônica, particularmente em pacientes com distúrbio do ciclo de ureia subjacente. Encefalopatia na ausência de níveis elevados de amônia também foi observada.

³ Considerar crises graves e verificar item "Quais cuidados devo ter ao usar o Ácido Valproico Biolab Genéricos?".

⁴ Reversíveis e irreversíveis. Atrofia cerebral também foi observada em crianças expostas ao ácido valproico em ambiente uterino que levou a diversas formas de eventos neurológicos, incluindo atrasos de desenvolvimento e prejuízo psicomotor.

⁵ Observado que pacientes recebendo somente ácido valproico mas ocorreu em sua maioria em pacientes recebendo terapia combinada. Sedação normalmente diminui após a redução de outros medicamentos antiepilépticos.

⁶ Reversíveis ou irreversíveis.

⁷ Esses efeitos são normalmente transitórios e raramente requerem descontinuação da terapia.

⁸ Inclui pancreatite aguda, incluindo fatalidades.

⁹ Observada primariamente em crianças.

¹⁰ Reversíveis.

¹¹ Com eventos aumentados de hirsutismo, virilismo, acne, alopecia de padrão masculino, andrógono.

¹² Incluindo azoospermia, análise de sêmen anormal, diminuição da contagem de espermatozoides, morfologia anormal dos espermatozoides, aspermia e diminuição da motilidade dos espermatozoides.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

População Especial

Uso em idosos

Uma alta porcentagem de pacientes acima de 65 anos relatou ferimentos acidentais, infecção, dor, sonolência e tremor. Não está claro se esses eventos indicam riscos adicionais ou se resultam de doenças preexistentes e uso de medicamentos concomitantes por estes pacientes.

Em pacientes idosos, a dosagem deve ser aumentada mais lentamente, com monitorização regular do consumo de líquidos e alimentos, desidratação, sonolência e outros eventos adversos. Reduções de dose ou descontinuação do medicamento devem ser consideradas em pacientes com menor consumo de líquidos ou alimentos e em pacientes com sonolência excessiva.

Uso em crianças

A experiência com crianças com idade inferior a dois anos têm um aumento do risco considerável de desenvolvimento de toxicidade

R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas.*

Ácido Valproico 250Mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

 **Nossas Lojas**

*Consulte a disponibilidade do produto na loja.

[Handwritten signature]

000840

A paciente seja aconselhada em relação a utilização de métodos contraceptivos e que a paciente seja capaz de manter a utilização de métodos contraceptivos efetivos sem interrupção durante todo o tratamento com ácido valproico;

A paciente tenha entendido a necessidade de visitas regulares (pelo menos anualmente) do tratamento pelo médico especialista em epilepsia;

A paciente esteja ciente de que deve consultar o médico assim que tiver planos de engravidar para fazer a transição do tratamento para uma alternativa apropriada antes da concepção e antes de interromper os métodos contraceptivos;

A paciente tenha entendido os perigos e as precauções necessárias associadas ao uso de ácido valproico e a necessidade urgente de informar seu médico caso exista possibilidade de estar grávida.

Essas condições também devem ser avaliadas para mulheres que não são sexualmente ativas a não ser que o médico considere que existem razões convincentes que indiquem que não existe risco de gravidez.

Crianças e adolescentes do sexo feminino

O médico responsável deve assegurar que os pais/responsáveis pela paciente compreendam a necessidade de informá-lo assim que a paciente utilizando ácido valproico fique menstruada pela primeira vez (menarca);

O médico responsável deve assegurar que os pais/responsáveis pela paciente que tenha menstruado pela primeira vez, tenham informações necessárias sobre os riscos de doenças congênitas e distúrbios no desenvolvimento do sistema nervoso, incluindo a magnitude desses riscos para crianças expostas ao ácido valproico em ambiente intrauterino;

Para essas pacientes, o médico especialista deve reavaliar anualmente a necessidade da terapia com ácido valproico e considerar alternativas para o tratamento. Caso o ácido valproico seja o único tratamento adequado, a necessidade de utilização de métodos contraceptivos eficazes e todas as outras medidas anteriormente descritas devem ser discutidas com a paciente e os pais/responsáveis. O médico deve realizar todo esforço necessário para fazer a transição do tratamento para uma alternativa apropriada antes que a paciente esteja sexualmente ativa.

A possibilidade de gravidez deve ser excluída antes de iniciar o tratamento com ácido valproico.

Contracepção

Mulheres em idade fértil que estejam utilizando ácido valproico devem utilizar métodos contraceptivos efetivos sem interrupção durante todo o tratamento com o produto. Essas pacientes devem estar providas de informações completas quanto à prevenção a gravidez e devem ser orientadas quanto ao risco da não utilização de métodos contraceptivos efetivos. Pelo menos 1 método contraceptivo eficaz único (como dispositivo ou implante intrauterino) ou 2 métodos complementares de contracepção, incluindo um método de barreira, deve ser utilizado. Circunstâncias individuais devem ser avaliadas em todos os casos, envolvendo a paciente na discussão quanto à escolha do método contraceptivo para garantir o seu engajamento e aderência ao método escolhido. Mesmo que a paciente tenha amenorrea, ela deve seguir todos os conselhos sobre contracepção eficaz.

Revisão tratamento

Deve ser realizada preferencialmente com um médico especialista. O médico deve revisar o tratamento pelo menos anualmente quando o ácido valproico foi a escolha mais adequada para a paciente. O médico deverá garantir que a paciente tenha entendido e reconhecido os riscos de malformações congênitas e distúrbios no desenvolvimento neurológico em crianças expostas ao produto em ambiente intrauterino.

Planejamento da gravidez

Para a indicação de Epilepsia, caso a paciente estiver planejando engravidar ou engravide, o médico especialista deverá reavaliar o tratamento com ácido valproico e considerar alternativas terapêuticas. O médico deve realizar todo esforço necessário para fazer a transição do tratamento para uma alternativa apropriada antes da concepção e antes de interromper os métodos contraceptivos. Se a transição de tratamento não for possível, a paciente deverá receber aconselhamento adicional quanto aos riscos do uso de ácido valproico para o bebê para suportar a paciente quanto à decisão de fazer um planejamento familiar.

Se, apesar dos riscos conhecidos de ácido valproico na gestação e após uma avaliação cuidadosa levando em consideração tratamentos alternativos, em circunstâncias excepcionais a paciente grávida poderá receber ácido valproico para o tratamento de epilepsia. Nesse caso recomenda-se que seja prescrita a menor dose eficaz, dividida em diversas doses menores a serem administradas durante o dia. É preferível a escolha da formulação de liberação prolongada para se evitar altos picos de

R\$ 39,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas*

Ácido Valproico 250Mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

 **Nossas Lojas**

*Consulte a disponibilidade do produto na loja

genitálias, defeitos nos membros e múltiplas anomalias envolvendo vários sistemas do corpo.

A exposição no útero ao valproato também pode resultar em deficiência/perda auditiva devido a malformações da orelha e/ou nariz (efeito secundário) e/ou devido à toxicidade direta na função auditiva. Os casos descrevem surdez unilateral e bilateral ou deficiência auditiva. Monitoramento de sinais e sintomas de ototoxicidade é recomendado.

Transtornos de desenvolvimento

A exposição ao ácido valproico durante a gestação pode causar efeitos adversos no desenvolvimento mental e físico para a criança exposta. O exato período gestacional predisposto a esses riscos é incerto e a possibilidade do risco durante toda a gestação não pode ser excluída.

Existem dados limitados sobre uso prolongado. Os dados disponíveis demonstram que crianças expostas ao ácido valproico durante seu período de gestação têm um maior risco de apresentar transtorno relacionado ao autismo em comparação com a população geral do estudo. Os dados disponíveis sugerem que crianças expostas ao ácido valproico durante a gestação podem ter o risco aumentado de desenvolver transtornos de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) comparado com a população em geral.

Risco em neonatos

Casos de síndrome hemorrágica foram relatados muito raramente em recém-nascidos que as mães utilizaram ácido valproico durante a gravidez. Essa síndrome hemorrágica está relacionada com trombocitopenia (diminuição do número de plaquetas do sangue), hipofibrinogenemia (diminuição da fibrinogênio do sangue) e/ou a diminuição de outros fatores de coagulação. A afibrinogenemia (caso em que o sangue não coagula normalmente) também foi relatada e pode ser fatal. Porém, essa síndrome deve ser distinguida da diminuição dos fatores de vitamina K induzido pelo fenobarbital e os indutores enzimáticos. A contagem plaquetária e testes de fatores de coagulação devem ser investigados em neonatos.

Casos de hipoglicemia (baixos níveis de açúcar no sangue) foram relatados em recém-nascidos que as mães utilizaram ácido valproico durante o terceiro trimestre da gravidez.

Casos de hipotireoidismo foram relatados em recém-nascidos que as mães utilizaram ácido valproico durante a gravidez.

Síndrome de abstinência (por exemplo, irritabilidade, hiperexcitação, agitação, hipercinesia, transtornos de tonicidade, tremor, convulsões e transtornos alimentares) pode ocorrer em recém-nascidos de mães que utilizaram ácido valproico no último trimestre da gravidez.

Lactação

O ácido valproico é excretado no leite humano com uma concentração que varia entre 1% a 10% dos níveis sanguíneos maternos.

Transtornos hematológicos foram notados em neonatos/crianças lactentes de mães tratadas com ácido valproico. A decisão quanto à descontinuação da amamentação ou da terapia com o medicamento deve ser feita levando em consideração o benefício da amamentação para a criança e o benefício da terapia para a paciente.

Apresentações do Ácido Valproico Biolab Genéricos

Cápsula 250 mg

Embalagem com 25 cápsulas.

Uso oral.

Uso adulto e pediátrico acima de 10 anos.

Medicamento Genérico - lei 9787/99.

Qual a composição do Ácido Valproico Biolab Genéricos?

Cada cápsula contém:

Ácido valproico 250 mg.

Excipientes: óleo de milho, óleo de ricino 40 polioxil hidrogenado, gelatina, glicerol, água purificada, metilparabeno, propilparabeno, dióxido de titânio, corante amarelo e corante vermelho.

R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas*

Ácido Valproico 250Mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia o bula.

 **Nossas Lojas**

*Consulte a disponibilidade do produto na loja

000894

precaução em pacientes epiléticos.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem original do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Interação medicamentosa: quais os efeitos de tomar Ácido Valproico Biolab Genéricos com outros remédios?

Caso esteja tomando alguns dos medicamentos a seguir, informe seu médico antes de iniciar o uso de ácido valproico. Ele dará a melhor orientação sobre como proceder.

Medicamentos que administrados junto ao valproato podem alterar sua depuração

Ritonavir, fenitoína, carbamazepina e fenobarbital (ou primidona): aumentam a depuração do valproato.

Antidepressivos: pouco efeito na depuração do valproato.

Medicamentos com importante potencial de interação quando usados junto ao valproato, levando a alterações das concentrações do valproato no sangue

Ácido acetilsalicílico: a concentração de valproato no sangue pode aumentar.

Antibióticos carbapenêmicos (ex: ertapenem, imipenem e meropenem): pode levar a redução significativa de valproato no sangue.

Contraceptivos hormonais contendo estrogênio: pode haver diminuição de valproato no sangue e aumento das crises epiléticas.

Felbamato: pode levar ao aumento de valproato no sangue.

Rifampicina: pode levar ao aumento de valproato no sangue.

Inibidores da protease (ex: lopinavir, ritonavir e outros): podem diminuir os níveis de valproato no sangue.

Colestiramina: pode levar a uma diminuição nos níveis de valproato no sangue.

Medicamentos para os quais não foi detectada nenhuma interação ou com interação sem relevância: antiácidos, cimetidina, ranitidina, clorpromazina, haloperidol, paracetamol, clozapina, lítio, lorazepam,

olanzapina, rufinamida.

Medicamentos com outras interações

Amitriptilina/nortriptilina: o uso concomitante de ácido valproico e amitriptilina raramente foi associado com toxicidade. Considerar a diminuição da dose de amitriptilina/ nortriptilina na presença de valproato.

Carbamazepina (CBZ)/carbamazepina-10,11-epóxido (CBZ-E): níveis sanguíneos de CBZ diminuíram 17% enquanto que os de CBZ-E aumentaram em torno de 45% na administração em conjunto do ácido valproico e do CBZ em pacientes epiléticos.

Clonazepam: o uso concomitante de ácido valproico e de clonazepam pode levar a estado de ausência em pacientes com história desse tipo de crises convulsivas.

Diazepam: a administração conjunta de ácido valproico aumentou a fração livre de diazepam.

Etosuximida: o ácido valproico inibe o metabolismo de etosuximida.

Lamotrigina: sua dose deverá ser reduzida quando administrada em conjunto com ácido valproico.

Fenobarbital: o ácido valproico inibe o metabolismo do fenobarbital. Todos os pacientes recebendo tratamento concomitante com barbiturato devem ser cuidadosamente monitorizados quanto à toxicidade neurológica.

Fenitoína: há relatos de desencadeamento de crises com a combinação de ácido valproico e fenitoína em pacientes com epilepsia.

Se necessário, deve-se ajustar a dose de fenitoína de acordo com a situação clínica.

Primidona: é metabolizada em barbiturato e, portanto, pode também estar envolvida em interação semelhante à do ácido valproico com fenobarbital.

Propofol: pode ocorrer interação significativa entre ácido valproico e propofol, levando a aumento no nível sanguíneo de propofol.

Portanto, quando administrado em conjunto com ácido valproico, a dose de propofol deve ser reduzida.

R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas*

Ácido Valproico 250mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

 **Nossas Lojas**

*Consulte a disponibilidade do produto na loja

Administrar o medicamento juntamente com a alimentação, ou com uma elevação gradual da dose a partir de um baixo nível de dose inicial pode evitar a irritação gastrointestinal.

Não ingerir Ácido Valproico com bebidas alcoólicas.

Interação com antibióticos carbapenêmicos

O uso concomitante de INN com antibióticos carbapenêmicos não é recomendado.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Qual a ação da substância do Ácido Valproico Biolab Genéricos (Ácido Valproico)?

Resultados de Eficácia

Os estudos descritos neste item foram conduzidos com divalproato de sódio oral.

Epilepsia

Crises Parciais Complexas (CPC)

A eficácia do divalproato de sódio na redução da incidência de crises parciais complexas (CPC) que ocorrem de forma isolada ou em associação com outros tipos de crises foi estabelecida em dois ensaios controlados usando divalproato de sódio comprimidos revestidos.

Em um estudo multicêntrico, placebo-controlado, empregado como terapia adjuvante, 144 pacientes que continuaram a apresentar oito ou mais CPCs durante oito semanas, por um período de oito semanas de monoterapia com doses de fenitoína ou carbamazepina suficientes para assegurar as concentrações plasmáticas no "intervalo terapêutico", foram randomizados para receber, em adição às suas medicações antiepiléticas originais, divalproato de sódio ou placebo.

Pacientes foram escolhidos ao acaso para prosseguir os estudos por um total de 16 semanas. A Tabela 1 descreve os achados.

Tabela 1 Estudo de Terapia Adjuvante Incidência Média de CPC por 8 semanas

Tratamento ADD-ON	Número de Pacientes	Incidência no início	Incidência Experimento
Divalproato de sódio	75	16,0	8,9*
Placebo	69	14,5	11,5

*Redução estatisticamente significativa no início maior para divalproato de sódio do que em placebo no nível $p \leq 0,05$.

A Figura 1 apresenta a proporção de pacientes (eixo X) cuja porcentagem de redução das taxas de crises parciais complexas no início foi pelo menos tão elevada quanto a indicada no eixo Y no estudo de tratamento adjuvante. Uma redução percentual positiva indica uma melhora (ou seja, redução na frequência das crises), enquanto que uma redução percentual negativa indica uma piora. Deste modo, em uma exposição deste tipo, a curva que demonstra um tratamento efetivo é deslocada para a esquerda da curva do placebo. O resultado demonstrou que a proporção de pacientes que atingiram um determinado nível de melhoria com divalproato de sódio foi consistentemente maior do que os pacientes que usaram placebo. Por exemplo, 45% dos pacientes tratados com divalproato de sódio tiveram uma redução na taxa de CPCs maior ou igual a 50%, comparado a 23% de melhoria para os pacientes que usaram placebo.

O segundo estudo avaliou a capacidade do divalproato de sódio em reduzir a incidência de CPCs como monoterapia antiepilética. O estudo comparou a incidência de CPCs entre os pacientes randomizados para receber altas ou baixas doses de tratamento.

Os pacientes foram selecionados para participarem dos estudos somente se:

Apresentaram duas ou mais CPCs por quatro semanas, durante um período de oito a doze semanas de monoterapia com doses adequadas de antiepiléticos (fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, primidona);

Pacientes que passaram por uma transição de duas semanas bem sucedida para divalproato de sódio.

Os pacientes foram então submetidos à ingestão das doses determinadas, com diminuição gradual da medicação antiepilética concomitante, por um período de 22 semanas. Porém, menos de 50% dos pacientes finalizaram os estudos.

R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas*

Ácido Valproico 250Mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

 **Nossas Lojas**

*Consulte a disponibilidade do produto no loja

000840

demonstra um tratamento menos efetivo. Os resultados mostraram que a redução na incidência de CPCs foi significativamente maior quando administrada altas doses de divalproato de sódio. Por exemplo, quando da alteração da monoterapia de carbamazepina, fenitoína, fenobarbital ou primidona para administração de doses elevadas de divalproato de sódio como monoterapia, 63% dos pacientes sofreram nenhuma alteração ou uma redução de taxas de epilepsia parcial complexa, em comparação com 54% dos pacientes que receberam doses mais baixas de divalproato de sódio.

Em um estudo clínico de divalproato de sódio como monoterapia em pacientes com epilepsia, 34/126 pacientes (27%) recebendo aproximadamente 50mg/Kg/dia em média, tiveram pelo menos um valor $\leq 75 \times 10^9$ plaquetas por litro. Aproximadamente metade dos pacientes tiveram o tratamento descontinuado e o retorno da contagem normal das plaquetas. Nos pacientes restantes, a contagem de plaquetas normalizou-se com a continuidade do tratamento. Neste estudo, a probabilidade de trombocitopenia aparece aumentar significativamente em concentrações de valproato ≥ 110 mcg/mL em mulheres ou ≥ 135 mcg/mL em homens. Em um estudo duplo-cego, multicêntrico com valproato em pacientes idosos com demência (idade média=83 anos de idade), as doses foram aumentadas em 125 mg/dia para uma dose alvo de 20 mg/kg/dia. Uma proporção significativamente mais alta de pacientes que receberam valproato apresentou sonolência, comparados ao placebo e embora não estatisticamente significante, houve maior proporção de pacientes com desidratação. Descontinuações devido à sonolência foram também significativamente mais altas do que com placebo. Em alguns pacientes com sonolência (aproximadamente a metade), houve consumo nutricional reduzido associado e perda de peso. Houve uma tendência dos pacientes que apresentaram esses eventos de ter menor concentração basal de albumina, menor depuração de valproato e maior ureia sanguínea.

Referências Bibliográficas:

Caso haja interesse em conhecer as referências bibliográficas e/ou estudos clínicos disponíveis para este medicamento, por favor, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor - Abbott Center através do telefone 0800 7031050.

Características Farmacológicas

O Ácido Valproico é um ácido carboxílico. Outro nome deste composto é 2-ácido propilpentanoico, 2-ácido propilalérico e n-ácido dipropilacético. O Ácido Valproico (pKa 4,8) é um líquido incolor com odor característico. Ele é pouco solúvel em água (1,3 mg/mL) e muito solúvel em solventes orgânicos. A sua fórmula empírica é $C_8H_{16}O_2$ e seu peso molecular é 144.

Farmacodinâmica

O Ácido Valproico se dissocia no íon valproato no trato gastrointestinal. Seu mecanismo de ação ainda não foi estabelecido, mas sua atividade parece estar relacionada com o aumento dos níveis do ácido gama-aminobutírico (GABA) no cérebro.

Farmacocinética

Absorção e biodisponibilidade

Doses orais equivalentes dos produtos Depakote[®] e Ácido Valproico cápsulas liberam quantidades equivalentes de íon valproato sistemicamente. Embora a taxa de absorção do íon valproato possa variar de acordo com a formulação administrada (líquida, sólida ou sprinkle), as condições de uso (jejum ou pósprandial) e métodos de administração (isto é, se o conteúdo das cápsulas é espalhado nos alimentos ou se as cápsulas são ingeridas intactas), estas diferenças poderão ter uma menor importância clínica sob as condições do estado de equilíbrio alcançado em uso crônico no tratamento da epilepsia. No entanto, é possível que as diferenças entre os vários produtos de valproato no $T_{máx}$ e $C_{máx}$ possam ser importantes no início do tratamento. Por exemplo, em estudos de dose única, o efeito dos alimentos tem uma maior influência na taxa de absorção do comprimido (aumento em $T_{máx}$ de 4 para 8 horas) do que na absorção de cápsulas sprinkle (aumento em $T_{máx}$ de 3,3 para 4,8 horas). Enquanto a taxa de absorção a partir do trato gastrointestinal e a flutuação das concentrações plasmáticas de valproato variam com o regime de dose e formulação, a eficácia do valproato como anticonvulsivante em uso crônico não é afetada. Experiências empregando regimes de doses de uma a quatro vezes ao dia, assim como estudos em modelos de epilepsias em primatas envolvendo taxas constantes de infusão, indicam que a biodisponibilidade sistêmica diária total (extensão de absorção) é o principal determinante do controle da convulsão e que as diferenças nas taxas de pico-vale plasmático entre as formulações de valproato não tem consequências conhecidas do ponto de vista clínico. Não é conhecido se as taxas de absorção influenciam a eficácia do valproato no tratamento da mania ou no tratamento da esquizofrenia. A biodisponibilidade de produtos orais de valproato com diferentes formulações e a influência entre as formulações foram

R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas*.

Ácido Valproico 250mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

 **Nossas Lojas**

*Consulte a disponibilidade do produto na loja

Em espécies animais, o valproato atravessa a placenta, numa extensão similar como em humanos.

Em humanos, várias publicações avaliaram a concentração de valproato no cordão umbilical de neonatos no parto. A concentração sérica de valproato no cordão umbilical, que é representativa da concentração sérica nos fetos, foi semelhante ou ligeiramente superior à das mães.

Metabolismo

Valproato é metabolizado quase totalmente pelo fígado. Em pacientes adultos sob o regime de monoterapia, 30-50% de uma dose administrada aparece na urina como conjugado glucoronídeo. Beta-oxidação mitocondrial é outra via metabólica importante, contribuindo tipicamente com mais de 40% da dose. Usualmente, menos de 15 a 20% da dose é eliminada por outros mecanismos oxidativos. Menos de 3% de uma dose administrada é excretada de forma inalterada pela urina. A relação entre dose e concentração total de valproato não é linear, a concentração não aumenta proporcionalmente com a dose, mas aumenta numa extensão menor, devido às proteínas plasmáticas de ligação que se saturam. A cinética do medicamento não ligado é linear.

Eliminação

A eliminação do divalproato de sódio e de seus metabólitos ocorre principalmente na urina, em uma menor quantidade nas fezes e no ar expirado. Uma pequena quantidade de medicamento não metabolizado é excretado na urina. A média da depuração plasmática e do volume de distribuição para o valproato total são de 0,56 L/h/1,73 m² e 11 L/1,73 m², respectivamente. As médias da depuração plasmática e do volume de distribuição para o valproato livre são de 4,6 L/h/1,73 m² e 92 L/1,73 m², respectivamente. A meia vida terminal média para a monoterapia com valproato, varia de 9 a 16 horas após a administração oral de 250 a 1000 mg. As estimativas citadas aplicam-se principalmente a pacientes que não estão recebendo medicamentos que afetam os sistemas de metabolização de enzimas hepáticas. Por exemplo, pacientes tomando medicamentos antiepilépticos indutores de enzimas (carbamazepina, fenitoína e fenobarbital) eliminarão o valproato mais rapidamente. Devido a essas alterações na depuração do valproato, a monitorização das concentrações dos antiepilépticos deverá ser mais rigorosa sempre que um outro antiepiléptico for introduzido ou retirado.

Populações especiais

Neonatos

Crianças nos dois primeiros meses de vida tem uma marcada diminuição na capacidade de eliminação de valproato, quando comparadas com crianças mais velhas e adultos. Isto é um resultado da depuração reduzida (talvez devido ao desenvolvimento tardio de glucuronosiltransferase e outros sistemas de enzimas envolvendo a eliminação do valproato), assim como o volume aumentado de distribuição (em parte devido à diminuição das proteínas de ligação plasmáticas). Por exemplo, em um estudo, a meia-vida em crianças abaixo de dez dias variou de 10 a 67 horas em comparação com uma variação de 7 a 13 horas em crianças maiores que dois meses.

Crianças

Pacientes pediátricos (entre 3 meses e 10 anos) tem depurações 50% mais altas em relação aos adultos, expressas em peso (isto é, mL/min/kg). Acima dos 10 anos de idade, as crianças têm parâmetros farmacocinéticos que se aproximam dos adultos.

Idosos

Pacientes idosos (entre 68 e 89 anos) tem uma capacidade diminuída de eliminação de valproato quando comparada com adultos jovens (entre 22 a 26 anos). A depuração intrínseca é reduzida em 39%; a fração livre de valproato aumenta em 44%; portanto, a dosagem inicial deverá ser reduzida em idosos.

Gênero

Não há diferenças no clearance da droga não ligada quando se ajusta a área de superfície corporal ente homens e mulheres (4,8 ± 0,17 e 4,7 ± 0,07 L/h/1,73m², respectivamente).

Etnia

Os efeitos da etnia sobre a cinética do valproato não foram estudados.

Doenças hepáticas

Doenças hepáticas diminuem a capacidade de eliminação de valproato. Em um estudo, a depuração de valproato livre foi diminuída em 50% em sete pacientes com cirrose e em 16% em quatro pacientes com hepatite aguda, comparada com seis indivíduos saudáveis. Nesse estudo, a meia-vida de valproato foi aumentado de 12 para 18 horas. Doenças hepáticas estão também associadas com o decréscimo das concentrações de albumina e com grandes frações não-ligadas de valproato (aumento de 2 a 2,6 vezes). A

R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou Tx de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas*

Ácido Valproico 250Mg/25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

 **Nossas Lojas**

*Consulte a disponibilidade do produto na loja

possam ser controlados com menores ou maiores concentrações plasmáticas.

000843



Como devo armazenar o Ácido Valproico Biolab Genéricos?

Conservar Ácido Valproico 250 mg, cápsula gelatinosa mole, em temperatura ambiente (15-30°C) e proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento

Ácido Valproico é apresentado sob a forma de cápsula gelatinosa mole, cor laranja claro opaco e laranja escuro opaco, contendo líquido oleoso de coloração amarela, com odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Dizeres Legais do Ácido Valproico Biolab Genéricos

Registro MS - 1.0974.0258

Farm. Resp.:

Dr. Dante Alario Junior

CRF-SP nº 5143

Fabricado por:

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.

Rua Solange Aparecida Montan 49

Jandira SP 06610-015

CNPJ 49.475.833/0014-12

Indústria Brasileira

Registrado por:

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.

Av. Paulo Ayres 280

Taboão da Serra SP 06767-220

SAC 0800 724 6522

CNPJ 49.475.833/0001-06

Indústria Brasileiro

Comercializado por:

Biolab Farma Genéricos Ltda.

Extrema MG

Venda sob prescrição médica – só pode ser vendido com retenção da receita.

Especificações

≈ R\$ 19,74

R\$ 17,29

ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online.

Compre este medicamento em uma de nossas lojas.

Ácido Valproico 250Mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

Nossas Lojas

*Consulte a disponibilidade do produto na loja




Institucional

- A Rosário
- Nossas Lojas
- Trabalhe Conosco
- Manipulação
- Viva Rosário

Ajuda

- Convênios
- Política de Privacidade
- Entregas
- Trocas e Devoluções
- Refazer último pedido
- Contato

Meios de pagamento



Receba Novidades e Promoções

Digite aqui seu melhor e-mail



Segurança



Faça o download do nosso aplicativo



Farmácia Nossa Senhora do Rosario LTDA | CNPJ: 59.603.977/0036-76 | I.E. 637.101.464.119 | Av. São Carlos, 2006 | Centro | São Carlos (SP) | CEP 13560-011 | Dúvidas, elogios e reclamações: Telefone (16) 3362-7304 | Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 8h às 18h, exceto feriados | Farmacêutico Responsável: Jandira Cristina Terruggi | CRF 47.716 | AFE: D14.2251 | CMVS - 354890622-477-00G031-1-5. As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Malores esclarecimentos, consultar o site: www.anvisa.gov.br. Os preços e promoções divulgados no site são válidos apenas para compras feitas pela internet e podem variar conforme região de entrega. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho de compras. Imagens meramente ilustrativas. A Farmácia Rosário trabalha com as tecnologias mais avançadas de proteção de dados, para que você possa realizar suas compras com tranquilidade. A privacidade e a segurança dos clientes são compromissos da Farmácia Rosário. Todos os pedidos efetuados estão sujeitos à confirmação da disponibilidade do produto em nosso estoque.

CNPJ: 59.603.977/0036-76
 Razão Social: Farmacia Nossa Senhora do Rosario Ltda
 © 2023 Farmacia Rosário. Todos direitos reservados.



R\$ 19,74
R\$ 17,29
 ou 1x de R\$ 17,29 sem juros

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online. Compre este medicamento em uma de nossas lojas*

Ácido Valproico 250mg 25 Comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.



*Consulte a disponibilidade do produto na loja

000849

Handwritten signature or initials.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 59.603.977/0036-76 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/08/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FARMACIA ROSARIO	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOUTOR CARLOS BOTELHO	NÚMERO 1900	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 13.560-250	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO CARLOS	UF SP
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@EZCONSULTORIA.COM	TELEFONE (11) 2306-9441
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2023 às 15:29:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000845

cupom
progressivo

15%

USE O CUPOM: **QUEROPROMO**

Drogaria São Paulo

O que você está buscando?

Início

Desconto Convênio

Calcular Frete

Descontos

Drogaria São Paulo > Medicamentos

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

DESCONTO CONVÊNIO

Exclusivo para clientes cadastrados no programa

VER DESCONTOS CONVÊNIO

Quer associar um convênio à Minha Conta?

CALCULAR FRETE

Novo endereço CEP

Informe seu CEP

Compre Junto



Ácido Valproico 250mg Genérico Biolab 25 Capsulas

R\$ 13,89 *4,25 - 0,3296*

R\$ 13,89

+

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogaria São Paulo

R\$ 13,89

30% OFF

Início

Minha conta

Notificações

Descontos

Favoritos

cupom **progressivo** 15% use o cupom: QUEROPROMO

Drogaria São Paulo

Início Desconto Convênio Calcular Frete Descrição

Ácido Valproico 250mg Genérico Biolab 25 Capsulas é utilizado para tratar crises epilépticas parciais complexas, quadros de ausência simples e complexa, auxiliar no tratamento de pacientes com crises de múltiplos tipos, incluindo crises de ausência, venda sob prescrição médica e retenção da receita.

[Baixar Bula](#) DESCRIÇÃO COMPLETA ▾

PROJETO INVERNO  **Leve 2 Pague 1** [comprar agora](#)

Especificações

Princípio Ativo	Com Ácido Valproico
Forma de Administração	Via Oral
Classificação	Tera Yerraelha
Doenças & Complicações	Para Enxaqueca
Partes do Corpo	Para Sistema Nervoso
Classe do Medicamento	Anticonvulsivantes
Prescrição Médica	Com Retenção De Receita
Tipo de Medicamento	Genéricos

Marca



MEDICAMENTOS BIOLAB

TODOS OS PRODUTOS BIOLAB

VENDIDO E ENTREGUE POR [Drogaria São Paulo](#)
R\$ 13,89

[+](#) [COMPRAR](#) 90% OFF

Epocier Sebor
Abacaxi Caixa 6

R\$ 17,49




Buscofen 400mg 10
Cápsulas

R\$ 23,90



Antisséptico Tópico
Merthiolate Spray

R\$ 19,29




Suplemento
Vitaminico Caloitran

R\$ 93,39




Neosaldina Solução
15ml

R\$ 38,39




Suplemento
Alimentar C-Triple 1g

R\$ 35,99



Cadastre-se

para receber as melhores ofertas
e super descontos!



Nome

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogeria São Paulo

R\$ 13,89

30% OFF

cupom progressivo **15%** use o cupom **QUEROPROMO**

Desconto Convênio Calcular Frete Descrição



Fale Pelo Chat

Envie Sua Solicitação

Central De Ajuda

Teleendas
4003-3393

Acompanhe Nas
Redes Sociais



Serviços

- Aferir Pressão
- Aplicação De Vacina
- Controle De Peso
- Furar Orelha
- Bulário Anvisa
- Testes Covid-19
- Consulta Online
- Terapia Online
- Convênio Farmácia
- Teleendas
- Medicamentos Especiais

Institucional

- Trabalhe Conosco
- Aplicativos
- Canal De Ouvidoria
- Venda No Marketplace

Descontos

- Descontos De Convênios

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogaria São Paulo

R\$ 13,89



COMPRAR

30% OFF



cupom progressivo

cupom 15% OFF

use o cupom: QUEROPROMO

006843

Handwritten signature

Drogaaria São Paulo

Início

Desconto Convênio

Calcular Frete

Descrição

Ajuda

Como Comprar

Entrega

Trocas E/ou Devoluções

Promoções

Formas De Pagamento

Marketplace

Retire Na Loja

VACINA DA GRIPE É SEMPRE AQUI.

Agende sua vacina e de toda a família.

A SUPERPROTEÇÃO DA TETRAVALENTE PARA CUIDAR DE VOCÊ. VACINA DA GRIPE CONTRA:

- ✓ H1N1
- ✓ H3N2
- ✓ INFLUENZA A
- ✓ INFLUENZA B

Vacina da gripe por **R\$ 59,90***

agende agora

*preço válido exclusivamente para pagamento online

Mais Informações

Copyright © Drogaaria São Paulo S.A. | CNPJ: 51.412.110/0565-33 | SAC: 0800 779 8767

São Paulo - SP: Avenida Renata, 60, Chácara Belenzinho - Vila Formosa | Giselaete Lima Mei CRF 40 354 | 24 Horas | Autorização De Funcionamento - Processor: 2831.659767/2014-90 | Autorização/MS: 7.31847.3 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Os preços e as promoções são válidos apenas para compras via internet. | As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. | *Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia. Antibióticos e antimicrobianos vendidos apenas em lojas físicas de telefones 4002 3307. Atendimento De Segunda à Sábado Das 08 às 22h00. Eventos Especiais: Portaria Nº 144 - 01/02/1998 - Ministério Da Saúde.

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogaaria São Paulo

R\$ 13,89

30% OFF

COMPRAR

000848



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.412.110/0565-33 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/12/2013
NOME EMPRESARIAL DROGARIA SAO PAULO S.A.				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA SAO PAULO				PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada				
LOGRADOURO AV RENATA		NÚMERO 60	COMPLEMENTO *****	
CEP 03.377-000	BAIRRO/DISTRITO CHACARA BELENZINHO	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DPSP.COM.BR		TELEFONE (11) 3274-7400		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2023 às 15:32:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000849

1

8/19

**Item 76: Valsartana 320mg
comprimido revestido**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

000850

Handwritten signature

cupom
progressivo

ganhe até **15%**

USE O
cupom: **QUEROPROMO**

Ótima Hora Para Comprar
Termina em 15:38:52

COMPARTILHE
EM REDES SOCIAIS

Drogarias Pacheco > Medicamentos



DESCONTO CONVÊNIO

Exclusivo para clientes cadastrados no programa

VER DESCONTOS CONVÊNIO

Como associar um convênio à Minha Conta?

CALCULAR FRETE

Não sei meu CEP

Informe seu CEP

Valsartana 320mg Genérico Germed 30 Comprimidos

645664

A Valsartana 320mg Genérico Germed é indicada em casos de hipertensão, insuficiência cardíaca e pós-infarto do miocárdio. A redução da pressão arterial diminui o risco de desenvolvimento de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal. Contém 30 comprimidos.

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco

R\$ 44,35 \div 30 = 1,4783

41% OFF



Início



Minha conta



Notificações



Descontos



Favoritos

cupom progressivo **15%** consulte condições use o cupom: **QUEROPROMO**

+ Pacheco


Início Desconto Convênio Calcular Preço Descrição

Última Hora Para Comprar Termina em 15:38:52

COMPRAR 3 UNIDADES por R\$24,84 cada

Forma de Administração	Via Oral
Classificação	Tarja Vermelha
Doenças & Complicações	Para Pressão Alta
Partes do Corpo	Para Sistema Circulatório
Classe do Medicamento	Anti-hipertensivos
Prescrição Médica	Sem Retenção De Receita
Tipo de Medicamento	Genéricos

Marca



- MEDICAMENTOS GERMED
- TODOS OS PRODUTOS GERMED

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogerias Pacheco
R\$ 44,35

41% OFF

+ **COMPRAR**
ASSINAR

cupom
progressivo

até 15%
para compra de produtos de farmácia

consulte condições

use o cupom: **QUEROPROMO**

Pacheco



Início Desconto Convênio Calcular Frete Descrição

Ótima Hora Para Comprar
Termina em 15:39:52

COMPRAR 3 UNIDADES
por R\$ 44,35

- Fale Pelo Chat
- Envie Sua Solicitação
- Central De Ajuda
- Televendas
4020-4404

Acompanhe Nas
Redes Sociais



Serviços

- Aferir Pressão
- Aplicação De Vacina
- Controle De Peso
- Furar Orelha
- Bulário Arvisa
- Testes Covid-19
- Consulta Online
- Terapia Online
- Convênio Farmácia
- Televendas
- Medicamentos Especiais

Institucional

- Trabalhe Conosco
- Aplicativos
- Canal De Ouvidoria
- Venda No Marketplace

Descontos

- Descontos De Convênios
- Descontos Em Medicamentos
- Viva Saúde

VENDIDO E ENTREGUE POR Droguarias Pacheco

R\$ 44,35

41% OFF

COMPRAR

ASSINAR

cupom progressivo **15%** compra com o código

USO O CUPOM: **QUEROPROMO**

pacapacheco


Inicio | Desconto Condição | Calcular Frete | Descargas

Otima Hora Para Comprar
Termina em 15:38:52

- Promocões
- Formas De Pagamento
- Marketplace
- Retire Na Loja

VACINA DA GRIPE É NA CERTA. VAI NA PACHECO.

Agende sua vacina e de toda a família.



A SUPERPROTEÇÃO DA TETRAVALENTE PARA CUIDAR DE VOCÊ. VACINA DA GRIPE CONTRA:

- ✓ H1N1
- ✓ H3N2
- ✓ INFLUENZA A
- ✓ INFLUENZA B

Vacina da gripe por **R\$ 59,90***

agende agora

*preço válido exclusivamente para pagamento online

Mais Informações

Copyright © Drogarias Pacheco | CNPJ: 33.438.253/0187-98 | SAC: 0800 262 1010

Rio De Janeiro - RJ, Rua Do Catete, 300 - Catete - CEP: 22220-000 | Gabriele Giovanelli - CRF 28127 | 24 Horas | Autorização De Funcionamento: Processo: 25351.493074/2012-10 | Autorização/MS: 7.26279.0 | As Informações Contidas Neste Site, Como Promoções E Ofertas De Remédios E Medicamentos, Não Devem Ser Usadas Para Automedicação E Não Substituem, Em Hipótese Alguma, A Medicação Prescrita Pelo Profissional Da Área Médica. Somente O Médico Está Em Condições De Diagnosticar Qualquer Problema De Saúde E Prescrever O Tratamento Adequado. Os Preços E As Promoções São Válidos Apenas Para Compras Via Internet. | As Fotos Contidas Em Nosso Site São Meramente Ilustrativas. | *Preços E Disponibilidade Sujeitos A Alterações No Decorrer Do Dia. Antibióticos E Antimicrobianos Vendidos Apenas Em Lojas Físicas Ou Televendas 4020 4404, Atendimento De Segunda À Sábado Das 08 Às 22h00, Exceto Feriados. Portaria N° 344 - 01/02/1990 - Ministério Da Saúde.

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco
R\$ 44,35



COMPRAR



ASSINAR



31% OFF

001 853



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.438.250/0187-08 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2003
NOME EMPRESARIAL DROGARIAS PACHECO S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA PACHECO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO R DO CATETE	NÚMERO 300	COMPLEMENTO *****
CEP 22.220-000	BAIRRO/DISTRITO CATETE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ	TELEFONE (11) 3274-7421/ (11) 3274-7400	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DPSP.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/06/2023 às 08:21:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



O que você procura?

000854

Ofertas para: Alterar



Todas as Categorias

- Ofertas
- Cuidado Infantil
- Dermocosméticos
- Medicamentos e Saúde
- Higiene e Beleza
- Monte a sua Lojinha
- Presentes das mães

Medicamentos e Saúde > Colesterol e triglicerídios > Valsartana 320mg Com 30 Comprimidos Genéricos Neo Química



Valsartana

Valsartana 320mg Com 30 Comprimidos Genéricos Neo Química

30 comprimidos



Leve 3 pague 2

Leve 3 pague R\$ 36,30 cada

30 = 1,21

 Adicionar kit

33%OFF
R\$ 81,69

R\$ 54,45

- 1 +

ADICIONAR



ÚLTIMAS UNIDADES DISPONÍVEIS! 673 pessoas compraram este produto hoje!



Vendido e entregue por Farmácias Pague Menos

Informações de entrega

Calcular frete

ok

Não sei meu CEP 

000855



Descrição

000856

APRESENTAÇÃO

A **Valsartana** é um medicamento usado para tratar a pressão arterial elevada e a insuficiência cardíaca. O remédio funciona diminuindo a pressão arterial e **umentando a capacidade do coração de bombear o sangue**. A Valsartana pode ser usada sozinha ou em combinação com outros medicamentos para tratar a pressão arterial elevada e também pode ser usada para tratar a insuficiência cardíaca, especialmente em combinação com outros medicamentos.

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém: valsartana 320mg

excipientes q.s.p. 1 comprimido revestido (celulose microcristalina, lactose monoidratada, crospovidona, dióxido de silício, talco, estearato de magnésio, álcool polivinílico, macrogol, dióxido de titânio, corante sicovit marrom e corante laca amarelo FD&C N° 6).

PARA QUE SERVE

O fármaco é indicado no tratamento da hipertensão arterial sistêmica e da insuficiência cardíaca congestiva em pacientes cuja pressão arterial não esteja adequadamente controlada com diuréticos tiazídicos ou betabloqueadores.

COMO DEVO USAR

Tome a dosagem ideal junto de um copo de água. Os comprimidos revestidos de valsartana podem ser tomados com ou sem alimentos. Consulte um médico para maiores recomendações.

Avaliações

5 estrelas 
4 estrelas 
3 estrelas
2 estrelas
1 estrela

3

4  4.5

0

0

0

7 avaliações

80%

Recomendam este produto



muito bom

O produto atendeu suas expectativas?

Sim

Por vencedor

Enviado há 11 meses



Bom produto, atende a minha necessidade.

O produto atendeu suas expectativas?

Sim

Por Francisco Carlos de Moraes De Caieiras - SP

Enviado há 1 ano



otimo resultado

O produto atendeu suas expectativas?

Sim

Por creio De ITU - SP

Enviado há 1 ano

1 - 3 de 7



ESCREVER AVALIAÇÃO



000857



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.626.253/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/1981
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FARMACIA PAGUE MENOS

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - Sociedade Anônima Aberta

LOGRADOURO
R SENADOR POMPEU

NÚMERO
1520

COMPLEMENTO

CEP
60.025-002

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
COSTA@PMENOS.COM.BR

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/06/2023 às 08:20:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.626.253/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/1981
NOME EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO R SENADOR POMPEU	NÚMERO 1520	COMPLEMENTO *****
CEP 60.025-002	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FORTALEZA
ENDEREÇO ELETRÔNICO COSTA@PMENOS.COM.BR	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2023** às **08:20:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

00858

cupom
progressivo

15%
desconto

USE O CUPOM: **QUEROPROMO**

Ótima Hora Para Comprar
Termina em 15:40:43

COMPARTILHAR

Drogas São Paulo > Medicamentos



DESCONTO CONVÊNIO

Exclusivo para clientes cadastrados no programa.

VER DESCONTOS CONVÊNIO

[Como associar um convênio à Minha Conta?](#)

CALCULAR FRETE

São 30 mil CEP

Informe seu CEP

Valsartana 320mg Genérico Germed 30 Comprimidos

645664

Valsartana 320mg Genérico Germed 30 Comprimidos é utilizado para tratamento da hipertensão, insuficiência cardíaca, pós-infarto do miocárdio. Sua ação relaxa os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade, o que reduz a pressão arterial.

VENDIDO E ENTREGUE POR Droga São Paulo

R\$ 44,35 \div 30 = 1,4783

11% OFF



Início



Minha conta



Notificações



Descontos



Favoritos

cupom
progressivo

15%
Desconto Progressivo


Use o Cupom: **QUEROPROMO**

Droga São Paulo

COMPRAR 3 UNIDADES
R\$ 44,35

Início	Desconto Convênio	Calcular Frete	Descrição
Última Hora Para Comprar Termina em: 16:40:48			
Forma de Administração	Via Oral		
Classificação	Tarja Vermelha		
Doenças & Complicações	Para Pressão Alta		
Partes do Corpo	Para Sistema Circulatório		
Classe do Medicamento	Anti-hipertensivos		
Prescrição Médica	Sem Retenção De Receita		
Tipo de Medicamento	Genéricos		
Registro MS	19SR308420175		

Marca



MEDICAMENTOS GERMED

TODOS OS PRODUTOS GERMED

Descrição

Como age o Valsartana?
A Valsartana pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como antagonistas do receptor da angiotensina II, os quais ajudam no controle da pressão arterial alta. A Valsartana atua bloqueando o efeito da angiotensina II. Com o resultado, as veias relaxam e a pressão sanguínea diminui.

Indicações
Tratamento de pressão alta, insuficiência cardíaca e pós-infarto do miocárdio em pacientes recebendo terapêutica usual.

Contraindicações
Não tome Valsartana caso você: já tenha apresentado reação alérgica ou incomum à Valsartana ou a qualquer outro componente da formulação; esteja grávida ou planejando engravidar; Durante a amamentação; Se você tem alto nível de açúcar no sangue e tem diabetes mellitus tipo 2 (também chamado diabetes mellitus não dependente de insulina) enquanto está tomando alisquireno, um medicamento utilizado para diminuir a pressão arterial. Se algum destes se aplicar a você, informe seu médico antes de utilizar Valsartana. Se você acha que pode ser alérgico, informe seu médico. Este medicamento é contraindicado para uso por lactantes. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.

ACESSIBILIDADE **A** **A+**

VENDIDO E ENTREGUE POR Droga São Paulo

R\$ 44,35

41% OFF

COMPRAR

ASSINAR

000859

cupom
progressivo

15%

Verifique condições

use o cupom: **QUEROPROMO**

Drogaria
São Paulo



Início Desconto Convênio Calcular Frete Descrição

Otima Hora Para Comprar
Termina em 15:40:43

OPÇÕES LIMITADAS
R\$ 107,30

Carrito

Antialérgico
Polarémine Creme

R\$ 17,99



Vitamina D Addera +
Imunidade Kids Com

R\$ 75,99



Reidrogante Oral
Hidroxibex Sabor

R\$ 19,69




Diclofenaco
Dietilamônio

R\$ 14,29




Doril Enxaqueca 8
Comprimidos

R\$ 13,92




Antiácido Gestrol 20
Pastilhas

R\$ 14,99



Cadastre-se

para receber as melhores ofertas
e super descontos!



Nome

Email

CADASTRAR

Leia os Termos de Uso e a Política de Privacidade

Drogaria
São Paulo

Fale Pelo Chat



VENDIDO E ENTREGUE POR Drogaria São Paulo

R\$ 44,35

41% OFF



COMPRAR



ASSINAR



000850

Handwritten signature

cupom progressivo

ganhando 15%

USE O CUPOM: QUEROPROMO

Drogeria São Paulo

UI

Início Desconto Convênio Calcular Frete Descrição

Ótima Hora Para Comprar
Termina em 15:40:45

GRIPE E SEMPRE AQUI.

Agende sua vacina e de toda a família.

Vacina da gripe por **R\$ 59,90***

agende agora

*preço válido exclusivamente para pagamento online

A SUPERPROTEÇÃO DA TETRAVALENTE PARA CUIDAR DE VOCÊ. VACINA DA GRIPE CONTRA:

- ✓ H1N1
- ✓ H3N2
- ✓ INFLUENZA A
- ✓ INFLUENZA B

Mais Informações

Copyright © Drogeria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.116/0565-33 | SAC: 0800 779 8767

São Paulo - SP, Avenida Renata, 60, Chácara Belenzinho - Vila Formosa | Gisela Lima Melo CRF 40.354 | 24 horas | Autorização De Funcionamento - Processo: 2531.559767/2014-90 | Autorização/MS: 7.31847.3 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Os preços e as promoções são válidos apenas para compras via internet. | As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. | Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do tempo. Antibióticos e Antimicrobianos vendidos apenas em lojas físicas ou telefarmácias 4003 2395. Atendimento de Segunda à Sábado Das 08 às 22h00, Exceto Feriados. Portaria Nº 344 - 01/02/1996 - Ministério Da Saúde.

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogeria São Paulo

R\$ 44,35

41% OFF



COMPRAR



ASSINAR



000859



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.412.110/0665-33 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 20/12/2013	
NOME EMPRESARIAL DROGARIA SAO PAULO S.A.	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA SAO PAULO	PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada	
LOGRADOURO AV RENATA	NÚMERO 80
COMPLEMENTO *****	
CEP 03.377-000	BAIRRO/DISTRITO CHACARA BELENZINHO
MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DPSP.COM.BR	TELEFONE (11) 3274-7400
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/06/2023 às 08:19:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

**Item 77: Valsartana 80mg
comprimido revestido**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada



000863




O que deseja encontrar?



Início > Medicamentos > Remédios > Para Pressão Alta > Valsartana 80mg 30 Comprimidos Ne

< Voltar

♥ Favoritar



VALSARTANA 80MG 30 COMPRIMIDOS NEO QUÍMICA GENÉRICO

Neo Química

30 Comprimidos Revestidos

VALSARTANA

0 de ★ ★ ★ ★ ★ (0)

VALSARTANA 80MG É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO GENÉRICO - LEI N.º 9.787/99.

Sobre o Produto

Indicação:

A valsartana é utilizada para os tratamentos de pressão alta, insuficiência cardíaca e pós-infarto do miocárdio em pacientes recebendo terapêutica usual. A valsartana é usada para tratar a pressão arterial elevada. A pressão arterial elevada aumenta a carga de trabalho do coração e artérias. Se isto continuar por muito tempo, pode danificar os vasos sanguíneos do cérebro, coração e rins, e pode resultar em um acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal. A pressão arterial elevada aumenta o risco de ataques cardíacos. A redução da pressão arterial para valores normais diminui o risco de desenvolvimento destas doenças. A valsartana também é usada para tratar a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca está associada à falta de ar e inchaço dos pés e pernas devido ao acúmulo de fluidos. A insuficiência cardíaca ocorre quando o músculo do coração não consegue bombear o sangue com força suficiente para abastecer o corpo. A valsartana pode também ser usada para tratar pessoas que sofreram um ataque cardíaco (infarto do miocárdio) para melhorar a sobrevivência e reduzir problemas cardíacos.

Posologia:

Como tomar valsartana Tome os comprimidos revestidos da valsartana com um copo de água. Os comprimidos revestidos da valsartana podem ser tomados com ou sem alimentos. A valsartana é para uso oral.

Quando não devo usar este medicamento:

Não tome valsartana: se você já apresentou uma reação alérgica ou incomum à valsartana ou a qualquer outro componente da formulação listado na bula (vide "Composição"). se você está grávida ou planejando engravidar. - durante a amamentação. se você tem alto nível de açúcar no sangue e tem diabetes mellitus tipo 2 (também chamado diabetes mellitus não dependente de insulina) enquanto está tomando alisquireno, um medicamento utilizado para diminuir a pressão arterial. Se algum destes se aplicar a você, informe seu médico antes de utilizar valsartana. Se você acha que pode ser alérgico, informe seu médico.

VALSARTANA 80MG É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO GENÉRICO - LEI N.º 9.787/99.


Características

000862

Handwritten signature

Adapt. Drogas

Início / Medicamentos / Remédios / Para Pressão Alta / Valsartana 80mg 30 Comprimidos Neo Química Genérico



R\$ 20,48 QUANTIDADE: 23483
R\$ 47,39 - 1 +

VALSARTANA 80MG 30 COMPRIMIDOS NEO QUÍMICA GENÉRICO

Neo Química
30 Comprimidos Resistentes
VALSARTANA

Vendido e entregue por Droga Raia

0 da



O que deseja encontrar?



Assinatura

Quê Para em Loja Minha Conta

Adapt. Fardos

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO GENÉRICO - LEI Nº 9.297/99.

Comprar

Adicionar aos favoritos

000865

SKU

111028

EAN

7896714241289

Peso (kg)

0.0170

Quantidade

30 Comprimidos Revestidos

Marca

Neo Química

Fabricante

Neo Química

Link Bula

Leia a bula

MS

1558404160203

Princípio Ativo Novo

VALSARTANA

Dosagem

80mg

Quem comprou este produto se interessou também por

Claritin Loratadina 10mg 6 Comprimidos

Bayer

6 Comprimidos






0 de 5      (0)

Mais vendidos da categoria

Soro Fisiológico Cloreto De Sódio 0,9% Needs 500ml

Needs

500ml Solução

0 de 5      (0)

000866

Os produtos mais vistos desta categoria são

Tylenol Paracetamol 500mg 20 Comprimidos

Tylenol

20 Comprimidos Revestidos

0 de 5 (0)

Veja avaliações de quem já comprou

As avaliações são coletadas por e-mail após a entrega do produto e

auditadas pela Trustvox que certifica que as opiniões são reais.



Central de Atendimento

3003-7242

Horário de atendimento das 7h às 21h,
de segunda a domingo.



Televendas

3003-7242

Horário de atendimento das 7h às 21h,
de segunda a domingo.

Privacidade de dados
Como protegemos seus dados
Política de Privacidade
Portal do Titular dos Dados

A Droga Raia segue as determinações da



000867



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.585.865/0240-93 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/2003
NOME EMPRESARIAL RAIA DROGASIL S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO	NÚMERO 638	COMPLEMENTO *****
CEP 05.359-001	BAIRRO/DISTRITO VILA BUTANTA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCALLEGALIZACAO@RD.COM.BR	
TELEFONE (11) 3769-5678		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/06/2023 às 08:23:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



O que você procura?

000868

Ofertas para: Alterar

Todas as Categorias

Ofertas Cuidado Infantil

Dermocosméticos

Medicamentos e Saúde Higiene e Beleza Monte a sua Loja das mães Presentes dia

Medicamentos e Saúde > Colesterol e triglicerídios > Valsartana 80mg Com 30 Comprimidos Genéricos Neo Química



Valsartana

Valsartana 80mg Com 30 Comprimidos Genéricos Neo Química

cod: 43719



Super oferta

45%OFF

R\$ 70,48

1

ADICIONAR



ÚLTIMAS UNIDADES DISPONÍVEIS! 483 pessoas compraram este produto hoje!



Vendido e entregue por Farmácias Pague Menos

Informações de entrega

Calcular frete

ok

Não sei meu CEP [?](#)

000869


~~8/5~~



Descrição

Valsartana 80mg Com 30 Comprimidos Genéricos Neo Química

Avaliações



Enviado há 1 ano



ótimo

Sexo Masculino O produto atendeu suas expectativas? Sim

Por Luiz Silva De São João dos Patos - MA

1 - 1 de 1



ESCREVER AVALIAÇÃO

000870



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.626.253/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/1981
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FARMACIA PAGUE MENOS	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta

LOGRADOURO R SENADOR POMPEU	NÚMERO 1520	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 60.025-002	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COSTA@PMENOS.COM.BR	TELEFONE
--	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/06/2023 às 08:30:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.626.253/0001-51
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/05/1981

NOME EMPRESARIAL
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

204-6 - Sociedade Anônima Aberta

LOGRADOURO
R SENADOR POMPEU

NÚMERO
1520

COMPLEMENTO

CEP
60.025-002

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
COSTA@PMENOS.COM.BR

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/06/2023 às 08:30:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

000879

Handwritten signature

cupom progressivo 15% use o cupom: QUEROPROMO

Inicio Desconto Convênio Calcular Frete Descrição

o que você está buscando?

Drogarias Pacheco > Medicamentos

DESCONTO CONVÊNIO

Exclusivo para clientes cadastrados no programa.

VER DESCONTOS CONVÊNIO

Como associar um convênio à Minha Conta?

CALCULAR FRETE

Não sei meu CEP

Informe seu CEP

Valsartana 80mg Genérico Germed 30 Comprimidos Revestidos

604054

O Valsartana 80mg Genérico Germed de 30 comprimidos revestidos é indicado no tratamento de hipertensão arterial. O medicamento bloqueia o efeito de contração dos vasos, causados pela substância angiotensina. Deve ser comprado com apresentação de receita médica.

Exibir Data

DESCRIÇÃO COMPLETA

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco

R\$ 33,99 ÷ 30 = 1,1330

52% OFF



Início



Minha conta



Notificações



Descontos



Favoritos

15%
Desconto Progressivo

consulte condições

use o cupom: **QUEROPROMO**

+ Pacheco

0

Início
Desconto Convênio
Calcular Frete
Descrição

- Doenças & Complicações [Para Pressão Alta](#)
- Partes do Corpo [Para Sistema Circulatório](#)
- Classe do Medicamento [Anti-hipertensivos](#)
- Prescrição Médica [Sem Retenção De Receita](#)
- Tipo de Medicamento [Genéricos](#)

Marca



MEDICAMENTOS DAIICHI-SANKYO

TODOS OS PRODUTOS DAIICHI-SANKYO

Descrição

ACESSIBILIDADE

A -

A +

Valsartana 80mg Genérico Germed 30 Comprimidos Revestidos pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como antagonistas do receptor da angiotensina II, os quais ajudam no controle da pressão arterial alta. A angiotensina II é uma substância do organismo que causa constrição dos vasos sanguíneos, causando assim o aumento da sua pressão arterial. A valsartana atua bloqueando o efeito da angiotensina II. Como resultado, as veias relaxam e a pressão sanguínea diminui. Se você tiver qualquer dúvida sobre como a valsartana funciona ou porque este medicamento foi prescrito para você, converse com o seu médico.

Princípio Ativo: Com Valsartana

Tipo de Medicamento: Genéricos

Ofertas incríveis da Farmacinha Pacheco

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco

R\$ 33,99

52% OFF



COMPRAR



000872



cupom progressivo **15%** use o cupom: **QUEROPROMO**

+ Pacheco

Nome: _____

Descrito: _____

Calcula Frete

Descrição

Cadastre-se

para receber as melhores ofertas e super descontos!



Nome

Email

CADASTRAR

Leia os [Termos de Uso](#) e o [Política de Privacidade](#)



Fale Pelo Chat



Envie Sua Solicitação



Central De Ajuda



Televendas
4020-4404



Acompanhe Nas
Redes Sociais



VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco
R\$ 33,99

32% OFF

COMPRAR



Institucional

- Trabalhe Conosco
- Aplicativos
- Canal De Ouvidoria
- Venda No Marketplace

Descontos

- Descontos De Convênios
- Descontos Em Medicamentos
- Viva Saúde

Privacidade

- Política De Privacidade
- Portal Do Titular De Dados Pessoais
- Como Protegemos Os Seus Dados
- Configuração De Cookie

Certificados



Ajuda

- Como Comprar
- Entrega
- Trocas E/Ou Devoluções
- Promoções
- Formas De Pagamento
- Marketplace
- Retire Na Loja

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogerias Pacheco

R\$ 33,99

52% OFF



COMPRAR



060873

cupom progressivo

15% OFF

USE O CUPOM QUEROPROMO

+ Pacheco

Início | Desconto Condição | Calcular Preço | Descrição

VACINA DA GRIPE É NA CERTA. VAI NA PACHECO.

Agende sua vacina e de toda a família.



A SUPERPROTEÇÃO DA TETRAVALENTE PARA CUIDAR DE VOCÊ. VACINA DA GRIPE CONTRA:

- ✓ H1N1 ✓ H3N2
- ✓ INFLUENZA A ✓ INFLUENZA B

Vacina da gripe por **R\$ 59,90***

agende agora

*preço válido exclusivamente para pagamento online

Mais Informações

Copyright © Drogarias Pacheco | CNPJ: 33.438.250/0187-08 | L.SAC: 0900 282 1010

Rio De Janeiro - RJ: Rua Do Catete, 366 - Catete - CEP: 22220-000 | Gabriele Giovanelli - CRF 28127 | 24 Horas | Autunização De Funcionamento: Processo: 25351.493074/2012-10 | Autorização/MS: 7.25279.01 | As Informações Contidas Neste Site, Como Promoções E Ofertas De Remédios E Medicamentos, Não Devem Ser Usadas Para Automedicação E Não Substituem, Em Hipótese Alguma, A Medicação Prescrita Pelo Profissional Da Área Médica. Somente O Médico Está Em Condições De Diagnosticar Qualquer Problema De Saúde E Prescrever O Tratamento Adequado. Os Preços E As Promoções São Válidos Apenas Para Compras Via Internet. | As Fotos Contidas Em Nosso Site São Meramente Ilustrativas. | *Preços E Disponibilidade Sujeitos A Alterações No Decorrer Do Dia. Antibióticos E Antimicrobianos Vendas Apenas Em Lojas Físicas Ou Televendas 4020 4404, Atendimento De Segunda À Sábado Das 08 Às 22h00, Exceto Feriados. Portaria Nº 344 - 01/02/1999 - Ministério Da Saúde.

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco

R\$ 33,99




COMPRAR

52% OFF



000874

884



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.438.250/0187-08 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DROGARIAS PACHECO S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA PACHECO	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada
--

LOGRADOURO R DO CATETE	NÚMERO 300	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------	----------------------

CEP 22.220-000	BAIRRO/DISTRITO CATETE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DPSP.COM.BR	TELEFONE (11) 3274-7421/ (11) 3274-7400
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/06/2023 às 08:32:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 08/07/2021 | Edição: 127 | Seção: 1 | Página: 76

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 127 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e pelo Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolve:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

§ 1º O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia.

§ 2º Os órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, quando executarem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, deverão observar os procedimentos de que trata esta Instrução Normativa.

§ 3º Para aferição da vantagem econômica das adesões às atas de registro de preços, bem como da contratação de item específico constante de grupo de itens em atas de registro de preços, deverá ser observado o disposto nesta Instrução Normativa.

Definições

Art. 2º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:

I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em série de preços coletados, devendo desconsiderar, na sua formação, os valores inexequíveis, os inconsistentes e os excessivamente elevados; e

II - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral.

CAPÍTULO II

ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO

Formalização

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterà, no mínimo:

I - descrição do objeto a ser contratado;

II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de planejamento;

III - caracterização das fontes consultadas;

IV - série de preços coletados;

V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;

VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;

VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e

VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 5º.

Critérios

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

Parágrafo único. No caso de previsão de matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia estabelecida no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Parâmetros

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

a) descrição do objeto, valor unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;

000876
de

c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;

d) data de emissão; e

e) nome completo e identificação do responsável.

III - informação aos fornecedores das características da contratação contidas no art. 4º, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e

IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput.

§ 3º Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em orçamento fora do prazo estipulado no inciso II do caput, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente responsável e observado o índice de atualização de preços correspondente.

Metodologia para obtenção do preço estimado

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º Com base no tratamento de que trata o caput, o preço estimado da contratação poderá ser obtido, ainda, acrescentando ou subtraindo determinado percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço.

§ 3º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 5º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente.

§ 6º Quando o preço estimado for obtido com base única no inciso I do art. 5º, o valor não poderá ser superior à mediana do item nos sistemas consultados.

CAPÍTULO III

REGRAS ESPECÍFICAS

Contratação direta

Art. 7º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, aplica-se o disposto no art. 5º.

§ 1º Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no art. 5º, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

§ 2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com objetos semelhantes de mesma natureza, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido.

§ 3º Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a justificativa de preços

demonstre a possibilidade de competição.

§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.

§ 5º O procedimento do § 4º será realizado por meio de solicitação formal de cotações a fornecedores.

Contratação de itens de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC

Art. 8º Os preços de itens constantes nos Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas, publicados pela Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, deverão ser utilizados como preço estimado, salvo se a pesquisa de preços realizada resultar em valor inferior.

Parágrafo único. As estimativas de preços constantes em modelos de contratação de soluções de TIC, publicados pela Secretaria de Governo Digital, poderão ser utilizadas como preço estimado.

Contratação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva

Art. 9º Na pesquisa de preço para obtenção do preço estimado relativo às contratações de prestação de serviços com regime de dedicação de mão de obra exclusiva, aplica-se o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, ou outra que venha a substituí-la, observando, no que couber, o disposto nesta Instrução Normativa.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Orientações gerais

Art. 10. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, salvo na hipótese de licitação cujo critério de julgamento for por maior desconto.

Vigência

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. Permanecem regidos pela Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, todos os procedimentos administrativos autuados ou registrados sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2001, e da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, incluindo contratações e eventuais renovações ou prorrogações de vigências respectivas.

CRISTIANO ROCHA HECKERT